

器瓣背端一巨棘形突，抱钩指形（图 569）。




图 569 柑橘孔夜蛾 *Corgatha dictaria*  
(Walker) ♂ 外生殖器

**寄主** 柑橘类。

**分布** 江苏、浙江、四川；日本。

#### 白线孔夜蛾 *Corgatha zonalis* Walker (图版 XL-49)

*Corgatha zonalis* Walker, [1859] 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 16: 216. (斯里兰卡)

*Ausinza aequa* Walker, 1864, J. Linn. Soc., zool. 7: 192.

*Corgatha zonalis*; Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 347. —Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 308. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 261.

翅展 17 mm。全体赤褐色。前翅布有暗褐及银色点，基线仅前端现一黑点，内线、外线及亚端线均灰白色，内线折角于中室前缘，前端两侧各一黑点，中室端一黑点，其前方的前缘脉有一黑点，外线两侧衬褐色，亚端线锯齿形，外方有一列灰白纹，近外缘有一列黑纹；后翅布有暗褐及银色点，外线、亚端线灰白色，后者锯齿形，外方有一列细白纹，近外缘有一列黑纹。

**分布** 四川；不丹，泰国，斯里兰卡，新加坡。

#### 褐孔夜蛾 *Corgatha semipardata* (Walker) (图版 XL-50)

*Guriauna semipardata* Walker, 1862, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 24: 1101, (沙捞越)

*Corgatha castanea* Hampson, 1896, Fn. Br. Ind. 4: 519.

*Corgatha castanea*; Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 310. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 261. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 328.

翅展 22 mm。头部黑色；胸部红棕色；腹部与前翅赤褐色，前翅前缘黑色，内区

前缘一白点，中室端有一黑纹，外线黑色，在翅脉上为黑点，前端一白点，线外侧另有一列白点，亚端线黑色，在5—7脉间为斑状，端线为一列黑点；后翅赤褐色，后缘区中部有一黑斑，外线为一列黑点，臀角有一黑斑，翅外缘一列白点一列黑点。

**分布** 广东、海南、云南；斯里兰卡，南太平洋若干岛屿。

## 瑕夜蛾属 *Sinocharis* Püngeler

*Sinocharis* Püngeler, 1912, Mitt. munch. ent. Ges. 3: 7.

Type-species: *Sinocharis korbae* Püngeler.

*Noshimea* Matsumura, 1931, Ins. Mats. 6: 210.

喙发达，下唇须短，向上伸达头顶，额平滑，触角线形；胸部被鳞扁平；腹部被毛；后足胫节有距两对；前翅顶角较圆。

### 瑕夜蛾 *Sinocharis korbae* Püngeler (图版XLI-1)

*Sinocharis korbae* Püngeler, 1912, Mitt. munch. ent. Ges. 3: 7. (Kasakewitsch)

*Noshimea fulgularis* Matsumura, 1931, Ins. Mats. 5: 210.

*Sinocharis korbae*: Draudt, 1935, in Seitz, Macrolep. World 3 Suppl. p. 208, pl. 23b. —Ogata, 1958, in Esaki, Icon. Het. jap. p. 154. —Chu *et al.*, 1964, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 2: 82. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 334. —Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 824.

翅展 39 mm。头部深棕色杂少许白色，额下部白色；胸部黄白色杂有少许黑色，足外侧黑色，有白色斑纹；前翅白色，内线内方黑色，基线白色曲折，内线中部内弯，外线双线黑色，自前缘脉外斜至4脉近端部，折角内弯，外线外方黑褐色，亚端线白色，前段不规则锯齿形，中段较直，后段内弯，端线白色，缘毛黑褐色；后翅白色，顶角及其外缘毛黑褐色；腹部白色，背面有灰色毛。

**寄主** 大丽花。

**分布** 黑龙江、吉林；日本，朝鲜等。

## 兰纹夜蛾属 *Stenoloba* Staudinger

*Stenoloba* Staudinger, 1892, Mem. Lep. 6: 381.

Type-species: *Dichagyris jankowskii* Oberthür.

*Neothripa* Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 382.

喙发达，下唇须斜向上伸，第二节约达头顶，额有尖锥形突起，复眼圆大，雄蛾触角有纤毛；胸部全被鳞片，前胸有斜立的长扁毛簇，后胸有散开毛簇；前足胫节有长