

分布 云南。

方首夜蛾，新种 *Craniophora fangi* Chen sp. nov. (图版IV-10)

体长 10mm；翅展 26mm。头部与胸部灰白色杂黑褐色，下唇须第二节外侧大部黑色，颈板端部杂黑色，翅基片外缘黑色，足外侧有黑斑纹；前翅底色灰白，内线与中线之间带褐色，内线内方杂有黑色，中线外方为一模糊黑色宽带，基线黑色，波浪形，自前缘脉至亚中褶，亚中褶基部有一黑纹，其外端围绕一褐白色卵形斑，内线黑色，波浪形外斜，环纹仅内缘现一黑曲纹，肾纹可见细黑边，中线黑色，微波曲外斜，在亚中褶处稍外突，外线细，双线黑色，细锯齿形，自前缘脉后外弯，4脉后内弯，后段外侧有一黑斑，外区前缘脉黑色，有一列白点，亚端线白色，两侧微衬黑色，不规则波浪形，外侧在7脉前、中褶及亚中褶处各有一黑纹，翅外缘有一列黑点，端线黑色，缘毛白色，中有一列新月形黑灰点；后翅白色，端部微带暗褐灰色；腹部褐灰色，基节背面灰白，毛簇端部黑色。

雄性外生殖器的钩形突细长，端部尖，抱器瓣稍窄长，腹缘曲度平稳，抱钩与瓣腹缘平行，端部尖，阳茎内囊有一列棘形角状器（图 57）。




图 57 方首夜蛾，新种 *Craniophora fangi* sp. nov. ♂ 外生殖器

正模 ♂，广西苗儿山，1 600m，1985，VII. 15，方承莱采。

本种外形极似 *Cr. jankowskii* Oberthür，主要区别为较小，雄性外生殖器的抱器瓣窄，有一抱钩。

## 纶夜蛾属 *Thalatha* Walker