

分布 山西。

### 太白山首夜蛾 *Craniophora taipaischana* Draudt (图版IV-1)

*Craniophora taipaischana* Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 6, pl. 1, figs. 17, 18.  
(太白山)

*Craniophora taipaischana*: Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 11.

翅展 31mm。头部白色带褐色；胸部褐色杂少许褐灰色，翅基片外缘有较多黑鳞；前翅褐色，基线、内线及外线均双线黑色，后者双线间微白，亚中褶基部有一黑弧纹，其前方有一扁形黄白斑，环纹黄白色，黑边，中央一黑点，肾纹大，褐色黑边，中线粗，黑色，亚端线黄白色，6脉后间断为点列，翅外缘一列围以白弧纹的黑点；雄蛾后翅红褐色，雌蛾暗褐色；腹部褐色。

分布 陕西。

### 黑点首夜蛾 *Craniophora harmandi* (Poujade) (图版IV-2)

*Acronicta harmandi* Poujade, 1898, Bull. Soc. ent. Fr. p. 229. (锡金)

*Acronicta nigramaculata* Warren, 1912, Nov. zool. 19: 1.

*Craniophora picata* Wileman, 1914, Entom. 47: 164.

*Craniophora harmandi*: Sugi, 1984, Jap. Het. Journ. 125: 404. —Chen, Wang et Lin, 1991, Noct. Fn. Xizang p. 47, pl. 1, fig. 17.

翅展 41mm。头部褐色杂白色，额有黑横线；胸部白色杂黑色；前翅黑褐杂灰白色，基线、内线及外线均双线黑色，后者锯齿形，中线黑色，亚端线灰白色波浪形，环纹褐色，灰白边，肾纹黑色，灰褐边，斑外侧灰白色，基线与内线间有一灰白斑，斑后黑色；后翅灰白色，端部灰褐色；腹部灰色，基部黄褐色。

分布 湖北、四川、云南；日本，朝鲜，俄罗斯，锡金，印度。

### 毛首夜蛾 *Craniophora inquieta* Draudt (图版IV-3)

*Craniophora inquieta* Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 7, pl. 1, fig. 22; pl. 10, fig. 4 male genitalia. (西天目山)

*Craniophora inquieta*: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 242, pl. 77, fig. 1755. —Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 11, pl. 1, fig. 21.

翅展 30mm。头、胸褐灰色杂暗褐色；前翅浅褐色，基部、中区及部分端区暗褐色，基线、内线均双线黑色，内线内侧的亚中褶有一黑纵纹，环纹斜圆形，肾纹双侧凹，两纹均黑边，外线黑色，内侧衬黄白色，亚端区 5—6 脉间有黑三角斑，亚中褶处一黑纵纹；后翅褐色；腹部黑灰色。雄蛾抱器瓣简单，端缘钝 (图 54)。

分布 黑龙江、河北、浙江；日本。