

姬夜蛾属 *Phyllophila* Guenée

Phyllophila Guenée, 1852, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins., Noct. 1: 254.

Type-species: *Anthophila wimmerii* Treitschke.

喙发达，下唇须斜向上伸，第二节几不及额中部，第三节短，额具圆形突起，端部稍粗糙，其下有角质片，复眼圆大，雄蛾触角有细纤毛；胸部几全被鳞片，无毛簇；腹部基节有毛簇；前翅顶角较钝，外缘曲度平稳，微锯齿形，有副室。

姬夜蛾 *Phyllophila obliterata* (Rambur) (图版XLI-9)

Antophila [sic] *obliterata* Rambur, 1833, Ann. Soc. ent. Gr. 2: 27, pl. 26, fig. 43. (科西嘉)

Phyllophila obliterata: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 383. Warren, 1912, in Seitz, Macrolep. World 3: 274. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 328.

翅展 19—21 mm。头、胸、腹及前翅黄白杂褐色，前翅基线仅前端现一黄白纹，中室有暗褐纹，内线、外线两侧衬褐色，环纹为一黑点，肾纹由二褐点组成，外线内侧有暗褐条，亚端线内侧衬暗褐色，后端达臀角，端线为一列黑点；后翅白色微带褐色。

寄主 除虫菊、蒿。

分布 黑龙江、内蒙古、新疆、河北、陕西、山东、江苏、浙江、湖北、江西、福建；亚洲西部，欧洲。

多型种。体色有变异。

卷绮夜蛾属 *Cretonia* Walker

Cretonia Walker, 1866, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 35: 1735.

Type-species: *Cretonia platyphaeella* Walker.

Swinhoea Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 324.

Swinhoea Hampson, 1902, Ann. S. Afric. Mus. 2: 295.

喙发达，下唇须向上伸，额突起呈球面形，复眼大，触角线形；胸部主要被鳞片，后胸有毛簇；前翅有副室；后翅 5 脉发达，自中室下角稍前发出。

甘薯卷绮夜蛾 *Cretonia vegetus* (Swinhoe) (图版XLI-10)

Spadix vegetus Swinhoe, 1885, Proc. zool. Soc. Lond. p. 475, pl. 28, fig. 14. (印度孟买)

Swinhoea vegeta: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 325, fig. 175.

Cretonia vegeta: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 388. —Chen, 1982, Icon.

Het. Sin. 3: 328.

翅展 18 mm。头部褐色；胸部红褐色带灰色；前翅褐色，内线内方褐灰色，基线褐色外弯，内线、中线及亚端线黑褐色，内线后半外斜，线外侧衬暗褐色，中线模糊，肾纹窄斜微黑，前、后端各一灰白点，外线双线黑色，7脉后波浪形；后翅褐色带灰色；腹部灰色带褐色。

寄主 甘薯、茛苕藤属。

分布 福建、广东、海南、广西、贵州、云南；印度，缅甸，斯里兰卡。

弱夜蛾属 *Ozarba* Walker

Ozarba Walker, 1865, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 32: 684.

Type-species: *Ozarba punctigera* Walker.

Acontiola Staudinger, (1900) 1899, Iris 12: 382.

喙发达，下唇须向上伸，第二节约达头顶，第三节稍长，额平滑，复眼圆大，雄蛾触角一般有细纤毛；胸部几全被鳞片，无毛簇；胫节一般有毛；腹部仅基节有毛簇；前翅顶角较钝，外缘曲度平稳，微锯齿形，8、9、10脉共柄，无副室。

种 检 索 表

- | | |
|-----------------|----------------------------|
| 1. 前翅有直中带 | 2 |
| 前翅中带非直 | 3 |
| 2. 前翅二色 | 分色弱夜蛾 <i>Ozarba bipars</i> |
| 前翅一色 | 弱夜蛾 <i>O. punctigera</i> |
| 3. 前翅带桃红色 | 红褐弱夜蛾 <i>O. brunnea</i> |
| 前翅不带桃红色 | 迷弱夜蛾 <i>O. incondita</i> |

弱夜蛾 *Ozarba punctigera* Walker (图版 XLI-11)

Ozarba punctigera Walker, 1865, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. p. 685. (中国；澳大利亚)

Ozarba punctigera: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 407. —Warren, 1912, in Seitz, Macrolep. World, 3: 274, pl. 51k. —Berio, 1950, Ann. Mus. civ. Stor. nat. Giac. Doria 64: 150.

翅展 19—24 mm。头、胸灰棕色；前翅内半灰棕，外半暗棕色，基线不显，内线、外线及亚端线灰色，内线、外线均双线，前者较直，外线折角于6脉，内线、外线间的亚中褶有一黑斑，亚端线中段外弯，后端达臀角，肾纹边缘微白，内方一黑色三角形斑，外侧一黑点，翅外缘一列黑点；后翅浅褐棕色；腹部褐灰色。

分布 江苏、浙江、湖北、贵州；日本，朝鲜，印度，大洋洲等。