

缘，浅黄色，外侧黑色，并扩展至亚端区，外区前缘脉上有 3 个黄色点；后翅褐色；雄蛾后翅长，顶角尖锐，翅前缘长于前翅；腹部黄褐色，背面带暗褐色。

分布 福建、海南、江西；印度，印度尼西亚，马来西亚。

毛尖裙夜蛾 *Crithote prominens* Leech (图版 LXII-7)

Crithote? prominens Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 572. (湖北长阳)

体长 12 mm；翅展 30 mm。头部与胸部暗灰褐色，下唇须黑褐色，额有向前伸的毛簇；前翅暗灰褐色，雄蛾前缘区 2/3 灰色带紫色，成一纵长条，其内端后缘达翅后缘，外端后缘外斜，中室后半之后带黑褐色；后翅暗灰褐色，无明显斑纹；腹部褐灰色。雌蛾前翅灰色纵长条在内区分出一外斜条达翅后缘，斜条内缘后部向内扩展，使内区后部成一黑斑，斑的外围衬白色。

分布 湖北、海南。

哈夜蛾属 *Hamodes* Guenée

Hamodes Guenée, 1852, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins., Noct. 3: 202.

Type-species: *Ophiusa propitia* Boisduval.

Kalmina Swinhoe, 1891, Trans. ent. Soc. p. 480.

喙发达，下唇须向前伸，第二节小，雄蛾触角有短纤毛丛；胸部具鳞片，胫节无刺；前翅前缘在顶角处常很拱曲，顶角尖锐而成钩状；后翅臀角平截。

种 检 索 表

- 1. 前翅顶角强外突而尖 2
前翅顶角稍外突 斜线哈夜蛾 *Hamodes butleri*
- 2. 雄蛾前翅前缘外半强拱 哈夜蛾 *H. propitia*
雄蛾前翅前缘不拱曲 暗纹哈夜蛾 *H. mandarina*

暗纹哈夜蛾 *Hamodes mandarina* (Leech) (图版 LXII-8)

Thermesia mandarina Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 570. (四川)

Hamodes mandarina: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 380. —Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 167. —Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 143. pl. 14, fig. 279.

翅展 48 mm 左右。头部与颈板深黄褐色杂黑褐色，胸部背面赭褐色；前翅赭褐色，布有黑褐色细点，前缘区内半部较致密，内线黑褐色，自中室直线内斜至后缘，环纹为一黑点，肾纹隐约可见，其内缘中部有一黑点，外线黑褐色，自近顶角处直线内斜至后