

褐藓夜蛾 *Cryphia brunneola* (Draudt) (图版IV-37)

Bryophila brunneola Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 14, pl. 3, fig. 4. (云南丽江)

Bryophila brunneola: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 268, pl. 82, fig. 1919.

翅展 29 mm 左右。头部及胸部淡褐灰色，额两侧有黑色楔形斑，颈板端部黑褐色，跗节有白斑；前翅淡灰褐色，翅脉微黑，基部有一黑纹，基线双线黑色，在亚中褶折角内斜，内线黑色，前端双线，外一线粗，在中室前有一黑褐线与基线相连，在亚中褶处有一黑纹与外线相连，其端部较棕褐，环纹灰褐色，黑边，稍窄斜，外侧微白，肾纹淡褐色，内缘黑色，中线仅前端现一黑斑，外线黑色，外侧衬白色，亚端线黑褐色细弱，锯齿形，在亚中褶处有一黑纵线与外线相连，端线黑色；后翅褐色；腹部灰褐色，毛簇黑色。

分布 云南。

小藓夜蛾指名亚种 *Cryphia minutissima minutissima* (Draudt)

Bryophila minutissima Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 15, pl. 3, fig. 5. (浙江天目山)

翅展 18 mm。头、胸及前翅浅褐色，前翅基线与内线黑色，亚中褶基部有一黑纵条，环、肾纹有不完整的黑边，外线双线黑色，内、外线间在 1 脉前有、黑纵条，其后衬暗棕色，亚端线黑色间断为不整齐的锯齿形纹，在 2 脉上为纵条形；后翅暗褐色；腹部暗灰褐色。

分布 浙江。

小藓夜蛾湖南亚种 *Cryphia mimutissima hunana* Draudt (图版IV-38)

Cryphia minutissima ssp. *hunana* Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 15. (湖南衡山)

翅展 21 mm。头部白色杂黑褐色，头顶及额上部灰绿色；前胸灰绿色，翅基片杂黑色；前翅灰绿色带褐色，环、肾纹间带紫褐色。

分布 湖南。

与指名亚种的主要差别在于体稍大，灰绿色。

石藓夜蛾 *Cryphia petricolor* (Lederer) (图版IV-39)

Bryophila petricolor Lederer, 1869, Ann. soc. ent. Belg., 13: 46, pl. 1, fig. 9. (外高加索)

Bryophila galathea Milliere, 1875, Rev. Zool. p. 241.

Bryophila amoenissima Turati, 1909, Natur. Sicil. 21: 86.

Bryophila petricolor: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 637. —Draudt, 1931, in Seitz, Macrolep. World 3 Suppl. p. 18.