

Xizang p. 50.




图 66 垣藓夜蛾 *Cryphia muralis*
(Forster) ♂ 外生殖器

翅展 29 mm。头、胸及前翅白色微带绿色，前翅基部有二黑点，各横线黑色，基线后有一黑线回转与内线合，线内方暗褐色，环、肾纹较靠近，肾纹小，暗褐色，外线外方有暗褐窄带，亚端线二曲形，外侧衬暗褐色；后翅白色带褐；腹部色似后翅。雄蛾抱钩微出瓣背（图 66）。

寄主 苔藓。

分布 新疆、西藏；亚洲西部，欧洲，非洲北部。

珠藓夜蛾 *Cryphia domestica* (Hufnagel) (图版 IV-28)

Phalaena domestica Hufnagel, 1766, Berl. Mag. 3 (4): 406. (德国)

Noctua perla [Denis et Schiffermüller], 1775, Wien. Verz. p. 70.

Bryophila domestica: Forster et Wohlfahrt, 1971, Schmiett. Mitteleur. p. 236. —Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 20.

翅展 32 mm。头、胸及前翅白色，前翅带绿色，基线黑色，内线双线黑色，外方有一片暗灰色，剑纹仅端部显黑与白色，环、肾纹黑色白边，中线黑色，后半内斜，外线黑色，前端为粗黑点，大部锯齿形，外区前缘脉黑色有白点，亚端线由黑点组成，前端内侧一灰斑；后翅白色，外线微黑，腹部白色。

寄主 苔藓。

分布 青海；欧洲。

常藓夜蛾 *Cryphia modesta* (Moore) (图版 IV-29)

Bryophila modesta Moore, 1881, Proc. zool. Soc. Lond. p. 332. (“N. W. Himalaya”)