




图 70 纹藓夜蛾东方亚种 *Cryphia orthogramma taishanensis*

Boursin ♂ 外生殖器

晦藓夜蛾 *Cryphia mitsuhashi* (Marumo) (图版IV-35)

Bryophila mitsuhashi Marumo, 1917, Lep. Het. Jap. p. 27, fig. 4. (日本)

Metachrostis obscura Warren, 1909, in Seitz, Macrolep. World 3: 22, pl. 4h.

Cryphia obscura Warren: Ogata, 1958, in Esaki, Icon. Het. jap. p.65, pl. 85, fig. 1865. —Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 683, pl. 167, fig. 35.

翅展 20 mm。头、胸褐黄杂黑褐色；前翅黄绿色，部分带褐色，基线黑色，后方一黑纹伸达翅基部，纹中另有黑点，内线黑色衬白，亚中褶处有一绿纵纹，环、肾纹肥大，黑边，中线黑色，1脉中部后方有一黑纵纹，外线黑色，外侧衬白色，亚端线粗，黑色，内侧微白；后翅褶色；腹部暗褐色。

分布 吉林；日本。

绿藓夜蛾 *Cryphia prasina* (Draudt) (图版IV-36)

Bryophila prasina Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 12, pl. 3, fig. 2. (山西绵山)

翅展 21 mm。头、胸及前翅白色带浅绿色，前翅基、内线间及端区带有黑色，基线与内线黑色，后者内侧衬白，在亚中褶及1脉上各有一黑点，剑纹黑色，环纹黑色白边，肾纹暗绿色，中有黑斑，外线黑色，后半锯齿形，外侧衬白色，亚端线黑色，前端外侧白色，内侧大部白色；后翅浅褐色；腹部白色。

分布 河北、山西。