

褐藓夜蛾 *Cryphia brunneola* (Draudt) (图版IV-37)

Bryophila brunneola Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 14, pl. 3, fig. 4. (云南丽江)

Bryophila brunneola: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 268, pl. 82, fig. 1919.

翅展 29 mm 左右。头部及胸部淡褐灰色，额两侧有黑色楔形斑，颈板端部黑褐色，跗节有白斑；前翅淡灰褐色，翅脉微黑，基部有一黑纹，基线双线黑色，在亚中褶折角内斜，内线黑色，前端双线，外一线粗，在中室前有一黑褐线与基线相连，在亚中褶处有一黑纹与外线相连，其端部较棕褐，环纹灰褐色，黑边，稍窄斜，外侧微白，肾纹淡褐色，内缘黑色，中线仅前端现一黑斑，外线黑色，外侧衬白色，亚端线黑褐色细弱，锯齿形，在亚中褶处有一黑纵线与外线相连，端线黑色；后翅褐色；腹部灰褐色，毛簇黑色。

分布 云南。

小藓夜蛾指名亚种 *Cryphia minutissima minutissima* (Draudt)

Bryophila minutissima Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 15, pl. 3, fig. 5. (浙江天目山)

翅展 18 mm。头、胸及前翅浅褐色，前翅基线与内线黑色，亚中褶基部有一黑纵条，环、肾纹有不完整的黑边，外线双线黑色，内、外线间在 1 脉前有、黑纵条，其后衬暗棕色，亚端线黑色间断为不整齐的锯齿形纹，在 2 脉上为纵条形；后翅暗褐色；腹部暗灰褐色。

分布 浙江。

小藓夜蛾湖南亚种 *Cryphia minutissima hunana* Draudt (图版IV-38)

Cryphia minutissima ssp. *hunana* Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 15. (湖南衡山)

翅展 21 mm。头部白色杂黑褐色，头顶及额上部灰绿色；前胸灰绿色，翅基片杂黑色；前翅灰绿色带褐色，环、肾纹间带紫褐色。

分布 湖南。

与指名亚种的主要差别在于体稍大，灰绿色。

石藓夜蛾 *Cryphia petricolor* (Lederer) (图版IV-39)

Bryophila petricolor Lederer, 1869, Ann. soc. ent. Belg., 13: 46, pl. 1, fig. 9. (外高加索)

Bryophila galathea Milliere, 1875, Rev. Zool. p. 241.

Bryophila amoenissima Turati, 1909, Natur. Sicil. 21: 86.

Bryophila petricolor: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 637. —Draudt, 1931, in Seitz, Macrolep. World 3 Suppl. p. 18.

Metachrostis petricolor: Warren, 1909, *ibid.* 3: 20.

Bryoleuca petricolor: Forster *et al.*, 1971, Schmett. *Mitteleur.* p. 236.

翅展 30 mm。头部与胸部浅白色，下唇须第二节端部白色；前翅灰色带褐，基线双线黑色，波浪形，内线双线黑色，波浪形外弯，环纹椭圆形，黑边，肾纹黑边，中有一黑纹，中线模糊黑色，外线双线黑色，波浪形，外侧衬白色，亚端线白色，内侧衬黑色，中段外弯，翅外缘有一列黑点；后翅褐灰色；腹部褐白色，背毛簇黑褐色。

分布 新疆；亚洲西部，欧洲。

土藓夜蛾 *Cryphia tephrocharis* Boursin (图版IV-40)

Cryphia tephrocharis Boursin, 1954, *Z. Wien. ent. Ges.* 40: 85, pl. 7, figs. 1, 2; fig. 5 male genitalia. (土耳其)

翅展 32 mm。头部、胸部与前翅浅褐灰色，前翅前缘带黑色，内线内方带浅黄色，内线黑色细弱，稍波曲，环纹与肾纹可见黑边，外线双线黑色，外一线弱，线间色浅，中段外弯，外区前缘色暗，带有黑色并有一列浅褐白点，亚端线不明显，两侧带黑色，中段外弯，顶角有一浅褐白内斜纹，端线由一系列新月黑点组成；后翅淡褐色；腹部灰白色。

分布 新疆；土耳其。

草藓夜蛾 *Cryphia algae* (Fabricius) (图版IV-41)

Noctua algae Fabricius, 1775, *Syst. Ent.* p. 614. (德国)

Noctua degener [Denis *et* Schiffermüller], 1775, Schmett. *Wien.* p. 70.

Bryophila algae: Hampson, 1908, *Cat. Lep. Phal. Br. Mus.* 7: 635. —Draudt, 1931, *in* Seitz, *Macrolep. World 3 Suppl.* p. 18. *Metachostis algae*: Warren, 1909, *ibid.* 3: 20.

Euthales algae: Forster *et al.*, 1971, Schmett. *Mitteleur.* p. 233.

翅展 22 mm。头部与胸部灰绿色，下唇须第二节外侧有黑褐纹，额两侧各一黑纹，颈板外缘黑色，翅基片有黑纵纹；前翅灰绿色，布有黑色细点，中区带有黑色，基线黑色，波浪形外斜，内线黑色外弯，环纹椭圆形，黑边，肾纹大，两侧中凹，黑边，外线双线黑色，外弯，4脉后波浪形内弯，亚端线色浅，内侧有一列小黑点，端线黑色；后翅浅黑褐色；腹部浅褐色。

寄主 地衣。

分布 黑龙江、新疆；中亚地区，欧洲。

欧藓夜蛾 *Cryphia ochsi* (Boursin) (图版IV-42)

Bryophila ochsi Boursin, 1940, *Bull. Men. Soc. Linn. Lyon*, 9: 110, pl. 1, fig. 7 male genitalia. (法国)