

Metachrostis petricolor: Warren, 1909, *ibid.* 3: 20.

Bryoleuca petricolor: Forster *et al.*, 1971, Schmett. Mitteleur. p. 236.

翅展 30 mm。头部与胸部浅白色，下唇须第二节端部白色；前翅灰色带褐，基线双线黑色，波浪形，内线双线黑色，波浪形外弯，环纹椭圆形，黑边，肾纹黑边，中有一黑纹，中线模糊黑色，外线双线黑色，波浪形，外侧衬白色，亚端线白色，内侧衬黑色，中段外弯，翅外缘有一列黑点；后翅褐灰色；腹部褐白色，背毛簇黑褐色。

分布 新疆；亚洲西部，欧洲。

土藓夜蛾 *Cryphia tephrocharis* Boursin (图版IV-40)

Cryphia tephrocharis Boursin, 1954, Z. Wien. ent. Ges. 40: 85, pl. 7, figs. 1, 2; fig. 5 male genitalia. (土耳其)

翅展 32 mm。头部、胸部与前翅浅褐灰色，前翅前缘带黑色，内线内方带浅黄色，内线黑色细弱，稍波曲，环纹与肾纹可见黑边，外线双线黑色，外一线弱，线间色浅，中段外弯，外区前缘色暗，带有黑色并有一列浅褐白点，亚端线不明显，两侧带黑色，中段外弯，顶角有一浅褐白内斜纹，端线由一系列新月黑点组成；后翅淡褐色；腹部灰白色。

分布 新疆；土耳其。

草藓夜蛾 *Cryphia algae* (Fabricius) (图版IV-41)

Noctua algae Fabricius, 1775, Syst. Ent. p. 614. (德国)

Noctua degener [Denis et Schiffermüller], 1775, Schmett. Wien. p. 70.

Bryophila algae: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 635. —Draudt, 1931, in Seitz, Macrolep. World 3 Suppl. p. 18. *Metachostis algae*: Warren, 1909, *ibid.* 3: 20.

Euthales algae: Forster *et al.*, 1971, Schmett. Mitteleur. p. 233.

翅展 22 mm。头部与胸部灰绿色，下唇须第二节外侧有黑褐纹，额两侧各一黑纹，颈板外缘黑色，翅基片有黑纵纹；前翅灰绿色，布有黑色细点，中区带有黑色，基线黑色，波浪形外斜，内线黑色外弯，环纹椭圆形，黑边，肾纹大，两侧中凹，黑边，外线双线黑色，外弯，4脉后波浪形内弯，亚端线色浅，内侧有一列小黑点，端线黑色；后翅浅黑褐色；腹部浅褐色。

寄主 地衣。

分布 黑龙江、新疆；中亚地区，欧洲。

欧藓夜蛾 *Cryphia ochsi* (Boursin) (图版IV-42)

Bryophila ochsi Boursin, 1940, Bull. Men. Soc. Linn. Lyon, 9: 110, pl. 1, fig. 7 male genitalia. (法国)