



图 423 银白冬夜蛾 *Cucullia nitida* (Chen) ♂ 外生殖器

本种近银装冬夜蛾，但额有横脊，前足胫节有长弯爪，前翅不带蓝色，雄蛾抱器瓣端部宽。

银冬夜蛾 *Cucullia argentina* (Fabricius) (图版 XXII-35)

Noctua argentina Fabricius, 1787, Ment. Ins. 2: 162. (俄罗斯)

Empusada argentina: Hampson, 1906, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 6: 86.

Cucullia argentina: Warren, 1910, in Seitz, Macrolep. World 3: 102. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 312.

翅展 36 mm。头、胸灰白色，颈板有二褐色横行线；前翅淡黄色，有一银白斑充满中室并扩展至前缘脉基部及亚中褶，其后缘衬黑棕色，银斑外的翅脉黑褐色，6脉基部前方有一黑棕点，顶角至后缘中部有一黑棕色斜条，后端扩展，端线为一列黑点；后翅白色，翅脉褐色；腹部浅赭黄色。

寄主 蒿属。

分布 新疆；欧洲，伊朗，土耳其，俄罗斯。

黄条冬夜蛾 *Cucullia biornata* Fische de Waldheim (图版 XXII-36)

Cucullia biornata Fische de Waldheim, 1840, Bull. Mosc. 83. (Volga)

Empusada biornata: Hampson, 1906, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 6: 89.

Cucullia biornata: Warren, 1910, in Seitz, Macrolep. World 3: 110. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 312.

翅展 46 mm。头部黄白杂暗褐色；胸部灰色杂暗褐色，颈板有二黑棕线；前翅灰