



图 423 银白冬夜蛾 *Cucullia nitida* (Chen) ♂ 外生殖器

本种近银装冬夜蛾，但额有横脊，前足胫节有长弯爪，前翅不带蓝色，雄蛾抱器瓣端部宽。

#### 银冬夜蛾 *Cucullia argentina* (Fabricius) (图版 XXII-35)

*Noctua argentina* Fabricius, 1787, Ment. Ins. 2: 162. (俄罗斯)

*Empusada argentina*: Hampson, 1906, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 6: 86.

*Cucullia argentina*: Warren, 1910, in Seitz, Macrolep. World 3: 102. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 312.

翅展 36 mm。头、胸灰白色，颈板有二褐色横行线；前翅淡黄色，有一银白斑充满中室并扩展至前缘脉基部及亚中褶，其后缘衬黑棕色，银斑外的翅脉黑褐色，6脉基部前方有一黑棕点，顶角至后缘中部有一黑棕色斜条，后端扩展，端线为一列黑点；后翅白色，翅脉褐色；腹部浅赭黄色。

寄主 蒿属。

分布 新疆；欧洲，伊朗，土耳其，俄罗斯。

#### 黄条冬夜蛾 *Cucullia biornata* Fische de Waldheim (图版 XXII-36)

*Cucullia biornata* Fische de Waldheim, 1840, Bull. Mosc. 83. (Volga)

*Empusada biornata*: Hampson, 1906, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 6: 89.

*Cucullia biornata*: Warren, 1910, in Seitz, Macrolep. World 3: 110. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 312.

翅展 46 mm。头部黄白杂暗褐色；胸部灰色杂暗褐色，颈板有二黑棕线；前翅灰

褐色，翅脉纹黑棕色，亚中褶及中室外半明显浅黄色，亚中褶基部一黑纵线，内、外线仅后半可见黑棕色锯齿形，端区各翅脉间有褐线及浅黄细纵线；后翅黄白色，端区微带褐色；腹部褐灰色。

**分布** 内蒙古、辽宁、新疆、河北；俄罗斯。

### 明冬夜蛾 *Cucullia lampra* (Püngeler) (图版 XXII - 40)

*Empusada* (*Cucullia*) *lampra* Püngeler, 1909, D. ent. Z. Iris, 21: 291, pl. 4, fig. 6. (新疆阿克苏)

*Cucullia lampra*: Warren, 1910, in Seitz, Macrolep. World 3: 110. —Draudt, 1934, in Seitz, Macrolep. World Suppl. 3: 124, pl. 16e.

翅展 43 mm。头部、胸部与前翅黄白色带灰色，前翅前缘后微黄，各横线不显，无环纹及肾纹，亚中褶基部有一黑纵纹，线形，端区翅脉部分带黑色，4脉前有一短黑纹，线形；后翅白色；腹部黄白色微带褐色。

**分布** 新疆。

### 碧银冬夜蛾 *Cucullia argentea* (Hufnagel) (图版 XXIII - 1)

*Phalaena argentea* Hufnagel, 1766, Berl. Mag. 3: 286. (德国)

*Argyrogalear argentea*: Hampson, 1906, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 6: 81.

*Cucullia argentea*: Warren, 1910, in Seitz, Macrolep. World 3: 102. —Kostrowicki, 1956, Pol. ent. Soc. 27: 26. —Sugi, 1982, in Inoue *et al.*, Moths Jap. 1: 723. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 312.

翅展 36 mm。头部褐色；胸部白色，颈板基部与端部及翅基片外缘褐色；前翅银白色，前、后缘各一灰绿纵纹，各横线为灰绿宽条，内、外线在中脉有一灰绿纵纹相连；后翅白色，端区褐灰色；腹部白色，基部几节赭黄。

**寄主** 蒿属。

**分布** 黑龙江、内蒙古、新疆、河北、西藏；日本，欧洲。

### 雪冬夜蛾 *Cucullia jankowskii* Oberthür (图版 XXIII - 2)

*Cucullia jankowskii* Oberthür, 1884, Et. ent. 10: 23, pl. 3, fig. 2 (Sidemi)

*Cucullia jancousci*: Hampson, 1906, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 6: 25.

*Cucullia jankowskii*: Warren, 1910, in Seitz, Macrolep. World 3: 102. —Boursin, 1941, D. ent. Z. Iris, 55: 54. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 311.

翅展 35 mm。头部棕色，颈板基部棕色，端半部白色；胸部及前翅白色，前翅内、外线区带灰棕色。后缘区中段褐色，基线黑色，内线双线棕色，线间白色，肾纹棕色有白圈，内方二黑点，外线黑色波浪形，近翅外缘一灰棕色窄带；后翅白色，外半渐带灰