

1956, Pol. ent. Soc. 37: 32. —Sugi, 1982, in Inoue *et al.*, Moths Jap. 1: 723. —
Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 311.

翅展 36 mm。头、胸及前翅灰褐色，前翅前缘区基部灰白色，亚中褶基部一黑纵纹，内线黑色，内侧衬白，外侧亦带白色，环、肾纹灰色，后者后端外突，外线暗灰色波浪形，亚端线灰色，前端内侧微黑，4脉前及2脉后各一黑纵纹穿过；后翅黄白，外半带灰褐色，腹部褐黄带灰色。

寄主 莴苣。

分布 吉林、辽宁、浙江；日本，欧洲。

斑冬夜蛾 *Cucullia maculosa* Staudinger (图版 XXIII - 6)

Cucullia maculosa Staudinger, 1888, Stett. ent. Zeit. p. 259. (乌苏里)

Cucullia maculosa: Hampson, 1906, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 6: 29. —Boursin, 1941, Iris 55: 56. —Chen, 1982, Icon. Het. sin. 3: 311.

翅展 42 mm。头、胸及前翅灰色，前翅微带紫色，基线仅前端现双黑纹，内线黑色锯齿形，亚中褶基部一黑纵纹，剑纹外方有一黑斑，环纹黄白色，肾纹灰色，各纹均黑边，外线黑色衬白色，亚端区一列暗褐纵纹，端区翅脉黑色；后翅白色微褐；腹部浅黄灰色。

分布 黑龙江、河北；日本，俄罗斯。

狭冬夜蛾 *Cucullia generosa* Staudinger (图版 XXIII - 7)

Cucullia generosa Staudinger, 1889, Stett. ent. Zeit. p. 51. (Issyk-kul)

Cucullia generosa: Hampson, 1906, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 6: 34. —Warren, 1910, in Seitz, Macrolep. World 3: 104. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 311.

翅展 42 mm。头部灰白色，头顶及额有黑条纹，额下部红褐色，下唇须外侧红棕色；胸部背面红棕色，颈板近基部有一黑横线，中部有二褐细线，端部有一褐线，翅基片边缘红棕色，下胸灰白色，足胫节外侧有黑纹；前翅灰色微带紫色，前缘区、中室及端区中段带有红棕色，中室基部后方有一明显黑纵纹，翅脉暗棕色，内线棕色，锯齿形，在亚中褶及1脉后外凸明显，后缘区有一黑纵纹伸至外线，环纹椭圆形；白色黑边，中央有褐圈，肾纹色似环纹，但前半的外缘线不显，两纹之间黑色，外线仅在前、后缘区可见，亚端区有一列黑纵纹，自顶角至肾纹列成斜行，端线由一系列黑色长点组成，缘毛浅红棕色，中有一白线；后翅褐棕色，缘毛白色；腹部灰褐色。

分布 青海、新疆；中亚地区。

嗜蒿冬夜蛾 *Cucullia artemisiae* (Hufnagel) (图版 XXIII - 8)

Phalaena artemisiae Hufnagel, 1766, Berl. Mag. 3: 292. (德国)