



图 429 冬夜蛾 *Cucullia umbratica* (Linnaeus) ♂ 外生殖器

分布 内蒙古、新疆、西藏；亚洲西部，欧洲。

**鲁冬夜蛾 *Cucullia lucifuga* (Denis et Schiffermüller) (图版 XXIII-18)**

*Noctua lucifuga* [Denis Schiffermüller], 1775, Schmett. Wien. p.312. (奥地利)

*Cucullia intermedia* Speyer, 1870, Ent. Ver. Stett. 31: 312.

*Cucullia cinderella* Smith, 1892, Proc. U. S. Nat. Mus. 15: 49.

*Cucullia lucifuga*: Hampson, 1906, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 6: 59.

翅展 46mm。头部与胸部紫灰色杂暗褐色，颈板近基部有一黑线，中部有一黑褐线；前翅紫灰色带有褐色并布有褐色细点，翅脉有暗褐纹，基线仅在前缘区现一褐纹，亚中褶有一黑纵纹自基部伸达内线，内线黑色，在亚中褶及 1 脉后强外凸，在 1 脉后内凸，中线黑褐色，自前缘脉至中室下角，肾纹仅后半可见暗褐边，中部内凹，后端稍内突，外线黑褐色，自前缘脉外斜至 5 脉，其后不明显，波浪形，4—5 脉间有一黑纵纹，顶角后有一近三角形褐纹，2 脉端部有一黑色斜纹，翅外缘有一列新月形黑纹；后翅白色带褐色，翅脉与端区色暗，缘毛基部褐色，其余白色；腹部黑褐色，腹面带灰色。

幼虫黑色，背面有一列橙色点，侧面有一列较小橙色点。

分布 黑龙江、内蒙古、青海；蒙古，欧洲，美洲。

**僧冬夜蛾 *Cucullia pullata* (Moore) (图版 XXIII-19)**

*Callaenia pullata* Moore, 1881, Proc. zool. Soc. p.258. (印度)

*Cucullia pullata*: Hampson, 1906, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 6: 56. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 106. —Boursin, 1941, Iris, 55: 71. —Chen *et al.*, 1991, Noct. Fn. Xizang p.204.