

*Cucullia elongata*: Hampson, 1906, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 6: 64. —Boursin, 1941, Iris, 55: 73. —Kononenko, 1979, Rev. ent. URSS. 58 (3): fig. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 312.

翅展 40mm。头、胸灰色杂暗褐色；前翅褐灰色，前缘区带黑褐色，翅脉黑色，中室外侧带赤褐色，亚中褶基部一黑线，内线双线暗褐色锯齿形，环、肾纹大，中凹，灰白色，外线黑色锯齿形，在翅后缘有一内伸黑纹，亚端区有隐约斜纹，2脉端部后有一黑纹，4脉前一黑纹；后翅浅褐色；腹部浅褐黄色。雄蛾抱器瓣稍窄，阴茎短，有一棘形及一小齿形角状器（图 433）。

**分布** 黑龙江、辽宁、青海、新疆；日本，印度。

### 勒冬夜蛾 *Cucullia ledereri* Staudinger (图版 XXIII-25)

*Cucullia ledereri* Staudinger, 1892, Mem. Lep. 6: 525. (Kamtshatka)

*Cucullia ledereri*: Warren, 1910, in Seitz, Macrolep. World 3: 108. —Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 724.

翅展 49mm。头、胸及前翅灰色微带褐色，前翅后缘区有黑纵纹，横线不明显，内线双线褐色波浪形，内侧亚中褶一黑线，环纹、肾纹浅灰色褐边，后者中凹，外线褐色锯齿形，在亚中褶处为双线，亚端线锯齿形，2脉端一黑纹内伸至外线，3—5脉间有黑褐纹；后翅白色，翅脉纹及端区黑褐色；腹部灰色。

**寄主** 紫菀属。

**分布** 黑龙江；日本，俄罗斯。

### 灰冬夜蛾 *Cucullia mediogrisea* Warren (图版 XXIII-26)

*Cucullia mediogrisea* Warren, 1911, Nov. zool. 18: 140. (印度)

*Cucullia mediogrisea* Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 107. —Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 100.

翅展 45mm。头、胸灰色；前翅灰色带褐色，内线褐色，前端为双褐纹，亚中褶、翅后缘基部各一黑纹，两纹相合外伸至2脉端部，环、肾纹赭黄色，边缘有黑点，两纹间的前方有黑斜纹，外线黑色锯齿形，外侧衬白色，亚端线在各翅脉间为黑或黑褐纵纹，4—7脉处的黑纹列成一斜条；后翅黄白色，翅脉及端区暗褐色；腹部灰色，背面大部褐色。

**分布** 广西；印度。

## 冠冬夜蛾属 *Lophoterges* Hampson

*Lophoterges* Hampson, 1906, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 6: 91.