

糊，黑褐色，自前缘脉至中室后缘，外线在2脉之前不明显，黑褐色，自前缘脉后外弯，在亚中褶处有二新月形灰白纹，端区有几个黑褐纹位于4、6脉前及亚中褶处，翅外缘有一列新月形黑褐点，缘毛浅灰色；后翅灰褐色，基半部色浅，缘毛浅灰色；腹部褐灰色，毛簇灰黑色。

分布 内蒙古；蒙古。

丽冬夜蛾 *Cucullia formosa* Rogenhofer (图版 XXIII-13)

Cucullia formosa Rogenhofer, 1860, Verh. zool.-bot. Ges. Wien. p.775. (匈牙利)

Cucullia formosa: Hampson, 1906, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 6: 38. —Warren, 1910, in Seitz, Macrolep. World 3: 105. —Forster & Wohlfahrt, 1971, Schmett. Mitteleur. p.171. —Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 101, pl. 9. fig. 202.

翅展41mm。头、胸灰色杂黑褐色；前翅灰色，基线仅前端现一黑纹，亚中褶一黑线，内线、外线均双线黑色，后者后半波浪形，环纹、肾纹白色黑边，两纹间黑色，中线黑色模糊，端区翅脉纹黑色，脉间另有黑纵纹；后翅白色，翅脉及端区褐色；腹部浅褐黄色。

寄主 蒿属。

分布 青海、西藏；欧洲。

贯冬夜蛾 *Cucullia perforata* Bremer (图版 XXIII-14)

Cucullia perforata Bremer, 1861, Lep. Ost.-Sib. 3: 490. (Ussuri, Emma)

Cucullia perforata: Hampson, 1906, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 6: 40. —Warren, 1910, in Seitz, Macrolep. World 3: 105. —Boursin, 1941, Iris 55: 55, pl. u, fig. 10. —Ogata, 1958, in Esaki, Icon, Het. jap. p.92. —Chen, 1982, Icon, Het. Sin. 3: 311.

翅展35mm。头、胸白色杂深棕色；前翅浅紫灰色，基线黑色仅前段可见，亚中褶基部一黑纵线，内线、外线均双线黑色，后者双线间杂白色，环纹、肾纹褐色，前者围以白环，后者内侧后半白色，中线黑色，亚端区在6脉前有几个黑纹，2脉端部后方一黑纵条；后翅黄白色，端区微褐；腹部褐灰色。

分布 黑龙江、河北、山东、福建；日本，朝鲜，俄罗斯。

黑条冬夜蛾 *Cucullia nigrifascia* Hampson (图版 XXIII-15)

Cucullia [sic] *nigrifascia* Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 239. (巴基斯坦)

Cucullia nigrifascia: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 106. —Chen. et al., 1991, Noct. Fn. Xizang p.205.

翅展25mm。头部灰色，两触角之间杂有白色，下唇须灰黄色，端部杂有白色；胸部灰色杂有白色及黑色，颈板灰白色，基部黑色，中部褐色；前翅灰黄色，布有黑褐细