

Icon. Het. Sin. 3: 310.

翅展 37 mm。头、胸灰白杂黑灰色，颈板有二黑棕线；前翅灰白色，前缘区，中脉区及后缘区带黑灰色，翅脉纹黑色，亚中褶一黑纵线，中室一黑褐纵线，其外半分支，翅后缘中段有一黑纵纹，基线、内线黑色锯齿形，肾纹白色褐边，外线黑色，后半不显，亚端区有一列黑纵纹自顶角至 4 脉，2 脉前后各一黑纵纹；后翅白色带褐；腹部白色带褐，背毛簇黑色。

分布 内蒙古、新疆；蒙古，俄罗斯。

内冬夜蛾 *Cucullia scopariae* Dorfmeister (图版 XXII - 37)

Cucullia scopariae Dorfmeister, 1853, Verz. Zool.-bot. Wien. p. 413. (奥地利)

Cheligalea scopariae: Hampson, 1906, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 6: 14. ——Boursin, 1941, Iris, 55: 49. ——Sugi, 1982, in Inoue *et al.*, Moths Jap. 1: 723.

翅展 36 mm。头、胸灰色杂褐色，颈板有白横条，前翅褐色，前缘区基部带白色，基、内线黑褐色，后者双线波浪形，环、肾纹褐色有白环和黑边，中线黑色波浪形，外线黑褐色波浪形，亚端线灰白，前段内侧一黑纹；后翅黄白色，翅脉与端区微褐；腹部赭黄色。

寄主 扫帚艾。

分布 黑龙江；俄罗斯，欧洲。

银装冬夜蛾 *Cucullia splendida* (Stoll) (图版 XXII - 33)

Phalaena Noctua splendida Stoll, 1782, in Cramer, Pap. Exot. 4: 242, pl. 400, fig. f. (俄罗斯)

Argyromata splendida: Hampson, 1906, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 6: 83. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 313.

翅展 31—39 mm。头、胸白色杂暗灰色；前翅银蓝色，后缘外半部土黄色，缘毛白色；后翅白色，端区带有暗褐灰色。

分布 内蒙古、甘肃、青海、新疆；蒙古，俄罗斯。

华冬夜蛾 *Cucullia sinopsis* Boursin (图版 XXII - 38)

Cucullia sinopsis Boursin, 1941, Iris, 55: 75, pl. 8, fig. 34; pl. 13, fig. 29. (四川巴塘)

翅展 40 mm。头部褐色；胸部及前翅褐白色，前翅横线不清晰，内线双线黑色，仅后段明显，前缘脉、中脉及 1 脉褐色，环纹边缘有四个黑点，肾纹内缘有两个黑点，两纹间的前缘区一黑褐斜纹，外线仅前端现一黑纹，端区有一列黑纵纹，2 脉端部一黑斜纹；后翅白色，端区微褐；腹部褐色。雄蛾阳茎有二长棘形角状器 (图 421)。

分布 四川、云南；俄罗斯。