

折角波浪形内斜；后翅深褐色，外区前半一粉蓝“S”形斑，1脉中部后方一黄曲纹，翅内半有光泽，臀角区有灰白雾状细点，其中有多条黑波纹，一灰白纹自中室端至翅外缘。

分布 海南、广西；印度，印度尼西亚。

眸夜蛾属 *Cyclodes* Guenée

Cyclodes Guenée, 1852, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins., Lep. 7: 26,

Type-species: *Erebus omma* Høeuen.

Beregra Walker, 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 14: 1291, 1315.

喙发达，下唇须斜向上伸，第二节约达头顶，第三节小，雄蛾触角线形；胸部被毛；腹部背面有粗毛脊；前翅顶角约呈方角形。

眸夜蛾 *Cyclodes omma* (Høeuen) (图版 LXI-18)

Erebus omma Høeuen, 1840, Tijds. Natur. Ges. Physiol. 7: 281, pl. 7, fig. 7. (爪哇)

Beregra replenens Walker, 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 14: 1315.

Cyclodes omma: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 488. —Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 142.

翅展 65 mm 左右。头部与胸部赭黄色，颈板端部棕色，翅基片有三条棕色斜纹，胸部背面杂有棕色；前翅赭黄色，有光泽，并有黄绿色调，外半带有白色，顶角区带有紫棕色，中室基部有一棕色纹，外方另一较大棕色斑，其外有一大圆斑，赭黄色，粗黑边，中央有黑纹，内线双线褐色，自前缘脉后分别绕圆斑后行，在斑后呈波浪形内斜，中线褐色，不清晰，在中室后波浪形内斜，向后渐宽，外线双线黑棕色，波浪形，线间及内侧白色杂紫色，在 2 脉后内斜，线间微白，亚端线黑色，自前缘脉至 4 脉，其后不显，6 脉后稍内弯，线外侧一黄绿色条纹，近外缘有一间断的黑色波浪形线，缘毛淡褐色，基部杂白色；后翅灰褐色，前缘区基半部黄白色，中线褐色，微曲外斜，外线双线白色，自 5 脉近基部外弯，外线外方带黑褐色，近外缘有一黑色微波浪形线，1—5 脉间明显，线内方有一波浪形白条纹，其内缘带绿色，线外方白色，带有绿色，端线细，黑色，波浪形，缘毛白色，除顶角区外，端部均带褐绿色；腹部浅赭黄色。

寄主 糖棕（果穗）。

分布 云南；锡金，印度，斯里兰卡，印度尼西亚。

盗胸夜蛾属 *Coarica* Moore

Coarica Moore, 1882, Lep. Atk. p. 153.