

in Inoue *et al.*, Moths Jap. 1: 763. —Chen, 1982, Het. Sin. 3: 272.

翅展 25—32 mm。头、胸及前翅黄色，后者布有红色细点，翅脉纹褐色，基线、内线红褐色，剑纹只现黑边，环纹、肾纹褐边，中线、外线及亚端线均褐色，后者锯齿形，与外线间污褐色，一黑褐线自顶角至肾纹后端；后翅浅黄带棕色，前缘区及端区色浅；腹部黄色带棕色。

分布 黑龙江；日本，俄罗斯。

棱夜蛾属 *Cytocanis* Hampson

Cytocanis Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 8.

Type-species: *Miana denticulosa* Walker.

喙发达，下唇须斜向上伸，第二节达额中部，额较大突起，其边缘有隆脊，下有钩状突，复眼大，圆形，雄蛾触角线形，稍扁，胸部主要被鳞，无毛簇，前足跗节较短，腹部背面无毛簇，前翅有副室。

肾棱夜蛾 *Cytocanis cerocalina* Draudt (图版 XXXVI-12)

Cytocanis cerocalina Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 124, pl. 8, fig. 10. (四川巴塘)

Cytocanis cerocalina: Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 43.

翅展 28 mm。头、胸黑色杂褐色；前翅暗褐色，部分带黑色，基线、内线及外线黑色，内、外线均双线，环纹铜褐色，肾纹大，灰白色，内缘尖，中线黑褐色，与外线间有一黑斑位于亚中褶，钝齿形，亚端线灰白色，内方在 7 脉前和中褶处各一黑方斑，4 脉至臀角间有一中凹的黑曲纹；后翅黑褐色；腹部褐色，有黑横条。

分布 四川、云南。

逸色夜蛾属 *Ipimorpha* Hübner

Ipimorpha Hübner, [1821] 1816, Verz. bek. Schmett. p. 238.

Type-species: *Noctua subtusa* [Denis et Schiffermüller].

Plastenis Boisduval, 1840, Meth. Eur. Lep. p. 93.

Zenobia Agassiz, [1847] 1846, Nom. zool. Ind. Univ. p. 69.

喙发达，下唇须斜向上伸，第二节达额中部，前方有毛，第三节短，额平滑，复眼圆大，雄蛾触角微扁，有纤毛；胸部有毛和毛状鳞，颈板成一背脊状，前胸有尖三角形毛簇，后胸有散开的毛簇；腹部基部有粗毛，但无毛簇；前翅前缘基部拱曲，顶角较尖，外缘一般在顶角后内削，不成锯齿形，有副室。