

自前缘脉外斜至 54 脉后内弯，有间断，亚端线黑色，锯齿形，在 7 脉处外凸，中段外弯，后端外斜，一黑色斜纹自顶角至亚端线，稍波曲，其内侧黑色，另一黑色斜纹自顶角内侧至亚端线，其两侧黑色，翅外缘有一列黑点，雌蛾亚端区的亚中褶处有一圆形黑斑；后翅灰褐色，外线双线褐色，波浪形，有间断，亚端线双线褐色，大波浪形，1 脉后外斜，翅外缘有一列黑点；腹部灰褐色。

**寄主** 黄檀属、含羞草属、黑荆树。

**分布** 湖南、福建、海南、广西、云南、西藏；缅甸，印度，斯里兰卡，孟加拉国，澳大利亚。

## 炬夜蛾属 *Daddala* Walker

*Daddala* Walker, 1865, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 33: 974.

Type-species: *Daddala* [sic] *quadrisignata* Walker.

喙发达，额平滑，后翅外缘中部的缘毛外突成齿形，雄蛾抱器瓣窄长，端半部指形。

### 种 检 索 表

前翅中线直 .....	<i>Daddala brevicauda</i>
前翅中线波曲 .....	<i>D. lucilla</i>

### 短炬夜蛾 *Daddala brevicauda* (Wileman et South) (图版LVII-7)

*Sypna brevicauda* Wileman et South, 1921, Entomologist 54: 202. (菲律宾)

*Daddala brevicauda*: Berio et Fletcher, 1958, Annali Mus. civ. Stor. nat. Giac. Doria 70: 333—335. —Holloway, 1976, Moths Borneo pl. 13, fig. 158.

翅展 50 mm。头、胸褐色杂灰黄色，额有黑斑；前翅浅灰黄带褐色。内半紫棕色，基、内线浅黄色波浪形，肾纹不清晰，中线白色，中室后直线达翅后缘，外线不显，仅前段可见黑色斜条，其中有一黄白线，亚端线黑褐色，近直线内斜至中褶折角外斜，近翅外缘有一列黑点；后翅大部黑褐色，中部一褐灰带，前宽后窄，端区浅褐色，近臀角有黑曲纹，近翅外缘一间断的黑线，端线黑色；腹部褐灰色。

**分布** 云南；印度，菲律宾，印度尼西亚，大洋洲。

### 光炬夜蛾 *Daddala lucilla* (Butler) (图版LVII-8)

*Sypna lucilla* Butler, 1881, Trans. ent. Soc. p. 206. (大吉岭)

*Sypna lucilla*: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 440. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 364.

*Daddala lucilla*: Berio & Fletcher, 1958, Annali Mus. civ. Stor. nat. Giac. Doria 70: