

端区灰色，中室下角至外线黄白色，翅后缘一黄白纵纹，基线双线黄褐杂白色，内线双线黑色，线间黄白色，剑纹大，前缘达中脉，环纹有白环，肾纹灰白色，外线双线黑褐色，线间灰白色，亚端线白色间断为细纹，内侧有黑齿纹，前端内侧有黑斑；后翅褐黄色；腹部灰褐色。

分布 西藏；印度，克什米尔地区。

折线激夜蛾 *Oroplexia retrahens* (Walker) (图版 XXXII-28)

Hadena retrahens Walker, 1857, List Spec. Ins. Colln Br. Mus. 11: 757. (斯里兰卡)

Oroplexia retrahens: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 512. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 265.

翅展 32mm。头、胸、腹褐灰色；前翅灰褐带紫色，中区、端区带黑色，翅脉微白，基线、内线均双线黑色，后者双线间灰白色，后端内侧一黑纹，环纹灰色，剑纹黑褐色，肾纹大部黑褐，中央灰色，外线双线白色，线间及内侧黑色，亚端线白色，在 3、4、7 脉外突成齿，端线为一列黑点；后翅褐色，外线微白。

分布 云南、西藏；锡金，印度，斯里兰卡，克什米尔地区。

达沓夜蛾属 *Data* Walker

Data Walker, 1862, J. Linn. Soc., zool. 6: 191.

Type-species: *Data thalpoiloides* Walker.

Lasioceles Bethune-Baker, 1906, Nov. zool. 13: 204.

喙发达，下唇须第二节约达头顶，第三节长，额圆形，复眼圆大，雄蛾触角有纤毛；胸部主要是鳞片，前、后胸有散开的毛簇，下胸有长毛，雄蛾后足腿节及胫节有大毛簇，后足第一跗节有毛；腹部有一列毛簇；前翅顶角较尖较拱，外缘锯齿形，臀角处微有鳞齿，有副室。

种 检 索 表

1. 后翅黄色 2
后翅暗褐色 齿达沓夜蛾 *Data clavis*
2. 前翅亚端区色浅 白质达沓夜蛾 *D. obliterated*
前翅一色 3
3. 前翅翅脉微白 美达沓夜蛾 *D. callopioides*
前翅翅脉不白 达沓夜蛾 *D. thalpoiloides*

美达沓夜蛾 *Data callopioides* (Moore) (图版 XXXII-29)

Thalpoila callopioides Moore, 1881, Proc. zool. Soc. p. 344. (印度)

Data callopistricides: Hampson, 1908. Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 528. —Chen *et al.*, 1991, Noct. Fn. Xizang p.261.

Callopiustria callopistricides: Holloway, 1989. Malay. Nat. J. 42: 161.

翅展 36—40 mm。头部褐色杂灰白及黑色；胸部灰褐杂黑色；前翅灰褐色，翅脉微白，基线灰白色，外侧中室处有一白斜纹，内线灰白色，两侧衬黑色，剑纹为一黑点，环纹、肾纹有白环及黑边，后者外侧有白点，外线灰白色，前半内侧有黑纹，亚端线黄白色，内侧翅脉间有黑纹；后翅内半黄色，外半褐色；腹部黄褐色，前、后端褐灰色。

分布 西藏；印度。

白质达沓夜蛾 *Data obliterated* Warren (图版 XXXIII-1)

Data obliterated Warren, 1911, Nov. zool. 18: 146. (Sarawak)

Data obliterated Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 157, pl. 18i.

Data obliterated: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 265.

翅展 35 mm。头部淡褐黄色，头顶带有褐色，下唇须第二节外侧大部黑褐色；胸部淡褐黄色，颈板基部带有褐色，前胸背面有黑毛；前翅底色黄白，大部带有紫褐色及少许黑色，基线只在前缘脉与中褶各现一黑点，亚中褶有一黑色纵纹，内线黄白色，两侧衬黑色，后端内侧有一黑色纵纹，肾纹赭色，轮廓不清，外线不明显，在肾纹外方的 6 与 4 脉后各有一黄白色纵纹，均衬以黑色，亚端线为一黄白色宽带，其内外缘均波浪形，内缘前端起自顶角，宽带中另有黑模糊的点列，端线由一系列三角形黑点组成；后翅黄色，端区有一暗褐色宽带；腹部污黄色。

分布 海南；马来西亚。

齿达沓夜蛾 *Data clava* (Leech) (图版 XXXIII-2)

Apamea? clava Leech, 1900, Trans. ent. Soc. 1900, p. 66. (中国西部: Moei-shan)

Eriopus clava: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 582. —Sugi, 1982, in Inoue *et al.*, Moths Jap. 1: 787.

翅展 30 mm。头、胸暗红棕色带紫色并杂有灰白色；前翅紫红棕色，布有细长黑色点，中室基部前后方各一黑纵纹，基线前端可见黑色，内线黑色，内侧亚中褶处一小黑斑，1 脉后有一黑纹，剑纹端缘黑色，环纹中央暗褐，外围浅紫色，中线黑色锯齿形，后半锯齿形，肾纹不明显，外侧有黑点，外线黑色锯齿形，前端一白点，肾纹前端一黑纹伸至外线，亚端线前半白色锯齿形，中部内侧一黑纹达外线，6—7 脉间一黑纹，外侧一列黑纵纹，顶角区有灰白点；后翅暗褐带紫；腹部黑棕色。

分布 福建、四川；日本。