

Data callopietrioides: Hampson, 1908. Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 528. —Chen *et al.*, 1991, Noct. Fn. Xizang p.261.

Callopietria callopietrioides: Holloway, 1989. Malay. Nat. J. 42: 161.

翅展 36—40 mm。头部褐色杂灰白及黑色；胸部灰褐杂黑色；前翅灰褐色，翅脉微白，基线灰白色，外侧中室处有一白斜纹，内线灰白色，两侧衬黑色，剑纹为一黑点，环纹、肾纹有白环及黑边，后者外侧有白点，外线灰白色，前半内侧有黑纹，亚端线黄白色，内侧翅脉间有黑纹；后翅内半黄色，外半褐色；腹部黄褐色，前、后端褐灰色。

分布 西藏；印度。

白质达沓夜蛾 *Data obliterated* Warren (图版 XXXIII-1)

Data obliterated Warren, 1911, Nov. zool. 18: 146. (Sarawak)

Data obliterated Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 157, pl. 18i.

Data obliterated: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 265.

翅展 35 mm。头部淡褐黄色，头顶带有褐色，下唇须第二节外侧大部黑褐色；胸部淡褐黄色，颈板基部带有褐色，前胸背面有黑毛；前翅底色黄白，大部带有紫褐色及少许黑色，基线只在前缘脉与中褶各现一黑点，亚中褶有一黑色纵纹，内线黄白色，两侧衬黑色，后端内侧有一黑色纵纹，肾纹赭色，轮廓不清，外线不明显，在肾纹外方的 6 与 4 脉后各有一黄白色纵纹，均衬以黑色，亚端线为一黄白色宽带，其内外缘均波浪形，内缘前端起自顶角，宽带中另有黑模糊的点列，端线由一系列三角形黑点组成；后翅黄色，端区有一暗褐色宽带；腹部污黄色。

分布 海南；马来西亚。

齿达沓夜蛾 *Data clava* (Leech) (图版 XXXIII-2)

Apamea? clava Leech, 1900, Trans. ent. Soc. 1900, p. 66. (中国西部: Moei-shan)

Eriopus clava: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 582. —Sugi, 1982, in Inoue *et al.*, Moths Jap. 1: 787.

翅展 30 mm。头、胸暗红棕色带紫色并杂有灰白色；前翅紫红棕色，布有细长黑色点，中室基部前后方各一黑纵纹，基线前端可见黑色，内线黑色，内侧亚中褶处一小黑斑，1 脉后有一黑纹，剑纹端缘黑色，环纹中央暗褐，外围浅紫色，中线黑色锯齿形，后半锯齿形，肾纹不明显，外侧有黑点，外线黑色锯齿形，前端一白点，肾纹前端一黑纹伸至外线，亚端线前半白色锯齿形，中部内侧一黑纹达外线，6—7 脉间一黑纹，外侧一系列黑纵纹，顶角区有灰白点；后翅暗褐带紫；腹部黑棕色。

分布 福建、四川；日本。