

达沓夜蛾 *Data thalpopiloides* Walker (图版 XXXIII-3)

Data thalpopiloides Walker, 1862, J. Linn. Soc. zool. 6: 192. (沙撈越)

Data thalpopiloides: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 529. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 265.

翅展 30 mm。头、胸深红棕色杂灰色；前翅深棕色带紫色，基线白色锯齿形，两侧衬黑色，内线灰色，两侧衬黑色，环纹斜，中央黑色，剑纹黑色，肾纹黑色灰边，外缘中部凹入，后外端有二点点，外线黑色，外侧衬灰色，较大外弯，至亚中褶至后缘为波浪形，亚端线黑色，锯齿形，由黑点组成，前端近顶角有一片灰白点，外线至亚端线一段的前缘脉有三个白点，端线为一列新月形黑点，缘毛锯齿形，黑色；后翅黄色，端部为一棕色宽带，端线为一列黑棕色新月形点，缘毛锯齿形；腹部黄色。

分布 福建、广东、海南、四川、西藏；印度，斯里兰卡，印度尼西亚，马来西亚，大洋洲。

散纹夜蛾属 *Callopistria* Hübner

Callopistria Hübner, [1821] 1816, Verz. bek. Schmett. p. 216.

Type-species: *Phalaena juvenina* Stoll

Eriopus Treitschke, 1825, Schmett. Eur. 5 (1): 365.

Miropalpa Berio, 1955, Mem. Inst. Sci. Madag. 6: 123.

喙发达，下唇须向上伸，第二节达头顶，有长毛，第三节长，向前伸，额无突起，雄蛾触角干多变化；胸部毛、鳞混生，前、后胸有毛簇。中胸有一对毛簇，胫节有长毛；腹部 1—3 节有毛簇；前翅外缘曲折，臀角处有鳞齿。

雄蛾抱器瓣简单，少有突起物，基部多较宽，向端渐窄。

种 检 索 表

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1. 雄蛾触角波曲 | 2 |
| 雄蛾触角不波曲 | 13 |
| 2. 雄蛾触角大波曲，具有突起并有鳞齿 | 3 |
| 雄蛾触角微波曲 | 5 |
| 3. 突起长，端部有毛簇 | 16 |
| 突起短 | 4 |
| 4. 前翅暗褐色 | 埃散纹夜蛾 <i>Callopistria aethiops</i> |
| 前翅红棕色 | 白散纹夜蛾 <i>C. albistrigoides</i> |
| 5. 雄蛾触角微曲，1/3 处突起 | 6 |