

翅展 41mm。头部、胸部与前翅褐色，后者外线外方色暗，基线与内线均双线黑褐色，后者微波浪形外弯，剑纹仅现一黑点，环纹不明显，黑褐边，肾纹中有暗褐纹，中线模糊，暗褐色，外线双线暗褐色，外一线弱，线间色浅，微波浪形外弯，亚端线褐白色，端线黑色；后翅浅褐色，腹部灰褐色。

分布 陕西。

贝歹夜蛾 *Diarsia beckeri* Boursin (图版 XIII-17)

Diarsia beckeri Boursin, 1948, Z. Wien. ent. Ges. 33: 116, pl. 2, fig. 11; pl. 12, fig. 53 male genitalia. (四川)

翅展 28mm。头部与胸部褐黄色杂少许白色；前翅红褐色，基线黑褐色，不完整，内线双线黑褐色，波浪形外斜，剑纹仅端部现一黑褐点，环纹近圆形，黑褐边，中央一黑点，肾纹短，黑褐边，中有一黑褐曲纹，中线粗而模糊，外线双线黑褐色，细锯齿形，外一线粗，外弯，在亚褶处内弯，亚端线黑褐色，细锯齿形，翅外缘有一列黑褐点；后翅污黄色；腹部褐色。

分布 四川。

广歹夜蛾 *Diarsia macrodactyla* Boursin (图版 XIII-18)

Diarsia macrodactyla Boursin, 1954, Bonn. zool. Beitr. 5: 250, pl. 4, figs. 10—11; pl. 10, fig. 38 mela genitalia. (广东连平)

翅展 30mm。头部与胸部褐色；前翅红褐色，基线与内线均由黑褐点组成，均双线，环纹大，但不明显，有细褐边，肾纹不清晰，有模糊暗褐边，中线粗而模糊，波曲，外线双线，细弱，中段间断为点列，亚端线隐约可见，外线与亚端线间的前缘区有一模糊暗褐色近三角斑；后翅灰褐色；腹部褐色。

分布 广东、四川。

亨歹夜蛾 *Diarsia henrici* (Corti et Draudt) (图版 XIII-19)

Rhyacia (*Diarsia*) *henrici* Corti et Draudt, 1933, in Seitz, Macrolep. World 3 Suppl. p. 75, pl. 11f. (青海)

Diraris diorismena Boursin, 1948, Z. Wien. ent. Ges. 33: 135.

Diarsia henrici: Boursin, 1954, Bonn. zool. Beitr. 5: 225.

翅展 35mm。头部、胸部及前翅红褐色，各横线不明显，剑纹稍粗，环纹近圆形，肾纹有不完整的黑褐边，环、肾纹间色较褐，中线只现一暗影，亚端线似一模糊暗褐带，前宽后窄；后翅浅红褐色；腹部褐色。

分布 青海、西藏。