

(触角窝以下)、上颚大部分及触角柄节前表面均为白色;翅基片浅褐色,大部分透明;翅透明,翅脉及翅痣黑褐色;跗节黑褐色;中足3—4跗节及末跗节基半部褐色,端半部黑褐色;腹部各腹板深褐色。体毛较长,唇基、上唇、眼侧(触角窝以下)及颊均被白长毛;眼侧(触角窝以上)颅顶、胸部背板及侧板、腹部第1节背板均密被黄至黄褐色长毛;胸腹面及各胫节外侧、中足基跗节外侧均被白长毛;中足及后足基跗节内侧被黑褐色毛;中足末跗节端部两侧被短黑毛;腹部第1—5节背板端缘具宽的浅黄色毛带;第6背板密被短小的浅黄色毛。

雄:未明。

分布 新疆。

### 未归亚属种类

#### 罗条蜂 *Anthophora loczyi* Mocsary, 1892

*Anthophora loczyi* Mocsary, 1892, *Termesz. Fuzet*, **15**: 130.

*Anthophora loczyi* Mocsary, 1941, Wu, *Cat. Ins. Sin.*, **6**: 299.

*Anthophora loczyi* Mocsary, 1988, Brooks, *Sci. Bull. Univ. Kans.*, **53** (9): 299.

雌体长12mm。胸部被白毛,杂有黑毛;腹部大部分被白毛,后足毛刷白色。颧眼距线状;触角宽短,第1鞭节短于节2+3+4;唇基表面刻点规则,中央具纵的光滑纹;上唇具粗皱;中胸密被刻点;腹部背板刻点密。体黑色;距褐色;翅透明,顶端色暗,翅基片黄褐色。额及胸部背面被黑毛杂有白毛;足被白毛;后足胫节被白绒毛;腹部第1节背板被雪白色长毛,第2—3节背板被短白毛,第4—5节背板被白绒毛,但第4节杂有小黑毛,第5节端部中央被褐色绒毛,第4—5节背板端缘具灰色绒毛带,腹面被白纤毛。

雄:未明。

分布 西藏(Jarkalo)。

#### 转条蜂 *Anthophora eversa* Cockerell, 1911

*Anthophora eversa* Cockerell, 1911, *Proc. U. S. Nat. Mus.*, **40**: 260.

*Anthophora eversa* Cockerell, 1941, Wu, *Cat. Ins. Sin.*, **6**: 297.

*Anthophora eversa* Cockerell, 1988, Brooks - *Sci. Bull. Univ. Kans.*, **53** (9): 297.

雌体长14mm;体被白毛;头及胸部杂有黑毛。头宽;上唇亚方形,表面具粗皱,基部两侧的斑平滑;颧眼距短;唇基隆起,表面闪光,具明显稀刻点,中央具1纵的光滑线;触角第1鞭节长于节2+3+4;中胸中央闪光,具分散的刻点;腹部椭圆形;臀板很窄。体黑色;头部黑色;复眼灰红色;翅基片锈色,基部褐色;翅色暗;足黑色;

跗节锈色；负爪节红色；距桔黄色。体毛白色；颜面及胸部被白毛，杂有黑毛；后基跗节毛嫩红色；腹部第1节背板被白毛，第2—4节背板被黑毛，其端缘具白毛带；第4节背板中央被灰毛；第5节背板被灰白色，中部端缘被暗褐色毛；腹板毛白色。

雄：未明。

分布 甘肃（兰州）。

### 狐红条蜂 *Anthophora abjuncta* Cockerell, 1922

*Anthophora abjuncta* Cockerell, 1922, *Proc. U. S. Nat. Mus.*, 60 Art. 18: 7.

*Anthophora abjuncta* Cockerell, 1941, Wu, *Cat. Ins. Sin.*, 6: 297.

*Anthophora abjuncta* Cockerell, 1988, Brooks, *Sci. Bull. Univ. Kans.*, 53 (9): 496.

雌体长12—14mm；似 *Anthophora plumipes*，主要区别：触角第1鞭节较短。翅基片锈色，翅浅烟色；末跗节暗红色；距红色。头部被黑毛；颊被灰色毛；胸部被鲜狐红色毛，无黑毛混杂；胸部腹面被白毛，但侧板被狐红色毛；后足胫节及基跗节毛刷暗红色，端部黑色；腹部第1节背板被灰黄色长毛组成的毛带，其他各节被黑色或黑褐色毛，并具长的浅黄色毛带。

雄：未明。

分布 四川（Suifu）。

### 白毛条蜂 *Anthophora robbi* Cockerell, 1911

*Anthophora robbi* Cockerell, 1911, *Proc. U. S. Nat. Mus.*, 40: 292.

*Anthophoru robbi* Cockerell, 1941, Wu, *Cat. Ins. Sin.*, 6: 298.

*Anthophora robbi* Cockerell, 1988, Brooks, *Sci. Bull. Univ. Kans.* 53 (9): 496.

雌体长14—15mm；体具白毛斑；后足基跗节全部被黑毛。体黑色。颜面、颊、前胸、胸侧、中胸端部、小盾片、并胸腹节及腹部第1节背板均被雪白色毛；颅顶、中胸（翅基片间）、腹部第2—5节背板均被短黑毛；后足毛刷黑色；腹部第2—4节背板端缘具白毛带。

雄：未明。

分布 北京。

### 花园条蜂 *Anthophora hortensis* Morawitz, 1886

*Anthophora hortensis* Morawitz, 1886, *Hor. soc. Entom. Ross.*, 20: 209.

*Podalirius hortensis* Morawitz, 1897, *Friese, Bienen Europa's*, 3: 148.

*Podalirius hortensis* Morawitz, 1941, Wu, *Cat. Ins. Sin.*, 6: 299.

雄体长10—11mm；胸部背面被浅黄色毛；腹部被白色长毛。唇基及眼侧具细而分