

被白(灰黄)色毛,无黑毛;腹部第4—5节腹板两侧具毛撮,尤以第5节密而长,非3—5节均具毛撮;第6—8腹板及生殖节均有区别。

新疆条蜂 *Anthophora (Clisodon) xinjiangensis* Wu, 1985 (图版V: 14)

Clisodon xinjiangensis Wu, 1985 Animals of Mt. Tuomuer Areas in Tianshan, 147—148. ♀

雌体长11—12mm,体黑色。上颚3齿,中齿较长;上唇宽大于长,表面粗糙;唇基宽稍大于长;触角第1鞭节长等于节4+5+6;唇基、颜侧及额均具密刻点;颊与复眼等宽;颅顶及颊的刻点较唇基稀而浅;中胸刻点密集,中央较稀;后足胫基板较大,顶端尖;腹部各背板革状。体黑色;翅透明,前缘较深;翅脉及翅痣黑褐色。上颚外侧具黑色长毛,端部被几根火红色长毛;上唇密被火红色长毛;唇基及颜侧(触角窝以下)被火红色毛,但较上唇者稀;颅顶、颊、颜侧(触角窝以下)均被黑毛;颊的端部被少量白毛;中胸背板前缘、后胸、并胸腹节、胸侧、腹部第1节背板、第2、3节背板两侧及前足转节、腿节及胫节外侧均被白色长毛;足被黑褐色毛;后足胫节及基跗节外表面被灰白色毛刷;后足胫节基部被少量黑色长毛;基跗节毛嫩黑褐色;腹部第2—4节背板中央被稀的黑毛;第4节背板端半部被稀的细小的火红色毛,两侧密被长的火红色毛;第1、2腹板边缘被白纤毛,第3—6腹板被火红色毛。

雄:未明。

分布 新疆(昭苏阿腊散)。

中华条蜂 *Anthophora (Clisodon) sinensis* (Wu), 1982

Clisodon sinensis Wu, 1982, Ins. Xizang, 2: 419. ♀

Anthophora (Clisodon) sinensis Wu, 1988, Brooks, *Sci. Bull. Univ. Kans.*, 53 (9): 489.

雌体长11mm;腹部被狐红色长毛。头宽大于长;颜面低矮;上唇及唇基均横宽;唇基及额唇基区刻点密集;上唇表面较粗糙;上颚3齿,基部具疣;颊窄小;触角第1鞭节长等于节2+3+4;中单眼周围刻点细,呈纵排列;侧单眼外侧各具1平滑小区;胸部刻点密,近中央渐稀,正中央光滑;后足胫基板舌状,顶端稍圆;腹部各节刻点密且均匀,但较浅。体黑色;上颚基部疣褐色;翅基片黑褐色;翅脉黑褐色;翅褐色透明,但前缘较深;足黑褐色;第2—5跗节褐色;距褐色;腹部各背板及腹板后缘褐色。上唇及上颚外侧被狐红色毛;唇基被褐色毛;颜侧及颅顶被黑毛;中胸背板前缘及侧板、小盾片、后胸及并胸腹节两侧密被浅黄色长毛;中胸中部被密而长的黑毛;前、中足胫节及基跗节均被狐红色毛;胫节内侧端部具黑毛;后足胫节及基跗节外侧被狐红色长毛;后腿节内侧被黑毛;后足胫节端部外侧被较稀的黑长毛;腹部第1节被浅黄色毛;第2—6节背板密被狐红色长毛,两侧杂有黄毛;第2—5节腹板后缘被狐红色长