

翅透明，翅脉褐色；距黄色；翅基片黄褐色。

雄 11—12mm。唇基（基侧角黑色斑）、上唇均浅黄色；触角第 2 鞭节稍长于第 3 节；体毛均灰白色；腹部第 2—4 节背板端缘具白毛带；腹部第 7—8 节腹板及生殖节见图 194。

分布 北京、陕西；波兰，乌克兰。

黑唇长须蜂 *Eucera* (*s. str.*) *discoidalis* Morawitz, 1878 中国新记录 (图 195)

* *Eucera discoidalis* Morawitz, 1878, *Hor. Soc. Entom. Ross.*, 14: 37. ♂

雄 13mm。唇基黄色，上唇黑色。唇基刻点大而粗，刻点间距小于刻点直径；中胸盾片四周及小盾片刻点细密，中胸盾片中央光滑，无刻点；触角长达腹部第 3 节背板末端；腹部背板刻点比中胸盾片细小且浅；中足基跗节稍弯；第 6 腹板中部两侧具小齿突，腹板表面稍凹、平滑，两侧具小脊突；第 7—8 腹板及生殖节见图 195。头部、胸侧及足、腹部第 1 节背板均被浅黄灰色长毛；腹部第 2 节背板被较短的灰黄色毛；第 3—4 节背板被短的黑褐色毛；第 4 节背板端缘为黄褐色毛带；第 5 节背板端缘为黄色毛带；第 6 节端缘为红褐色毛带。翅透明，浅烟色；翅基片及距黄色；翅脉褐色。




图 195 黑唇长须蜂 *Eucera* (*E.*) *discoidalis* ♂

a. 第 7 腹板；b. 第 8 腹板；c. 生殖节

雌：未明。

分布 东北、内蒙古；高加索。

社会长须蜂 *Eucera* (*s. str.*) *sociabilis* Smith, 1873 中国新记录

Eucera sociabilis Smith, 1873, *Ent. Soc. London*, 204.

Eucera andreae Friese, 1910, *Verh. Zool.-bot. Ges.*, Wien, 60: 406.

Eucera sociabilis Smith, 1911, Cockerell, *Proc. U. S. Nat. Mus.*, 40: 241—264.