

肿胫条蜂 *Anthophora (Paramegilla) podagra* Lepeletier, 1841 中国新记录 (图 111)

Anthophora podagra Lepeletier, 1841, *Hist. nat. Insect. Hymen.*, 2: 44. ♂

Anthophora cinerea Eversmann, 1852, *Bull. soc. natur. Moscou*, 25: 3, 112. ♂

Anthophora segnis Eversmann, *Bull. soc. natur. Moscou*, 25: 3, 113.

Anthophora segnis Dours, 1869, *Monogr. icon. Anthophora*, 139.

Anthophora fulvipes Dours, 1869, *Monogr. icon. Anthophora*, 108.

Anthophora podagra F. Morawitz, 1876, *Hor. Soc. Entom. Ross.*, 12: 21.

Anthophora tomentosa Mocsary, 1878, *Termesz Fuzet*, 2: 17.

Anthophora (Paramegilla) podagra Lepeletier, 1988, *Brooks, Sci. Bull. Univ. Kans.*, 53(9): 476.

雌体长 12mm；胸部基部被白毛，中部具黑毛；腹部末端具桔黄毛。唇基（侧面观）仅及复眼宽的 1/3，表面刻点细密；上唇端缘中央有 3 小齿突，表面粗皱；触角第 1 鞭节长等于节 2+3+4；胫基板椭圆形，端部宽圆；臀板端半部两侧几平行，端缘钝。体黑色；翅基片、翅脉均褐色；距黑色；胫基板黄褐色，周边黑色；腹部第 1—5 节背板端缘黑褐色，其中第 4 节色较浅，为褐色。体毛灰白色为主；眼侧、额、颅顶、颊、胸部背板基部、侧板、后胸、并胸腹节、腹部第 1 节背板及足的腿节外侧均被长的白毛；中胸中部密被黑毛；前、中足各胫节外表面密被细黄毛；前足基跗节外侧缘被黄毛，毛的端半部黑色；中足基跗节外表面具较短的黄色毛；后足胫节及基跗节毛刷为黄色；毛嫩金黄色；各足胫节及基跗节内表面被黑毛；腹部第 2—4 节背板密被鳞状细黄毛，第 5 节背板两侧密被浅黄色长毛，中部具桔黄色毛；臀板两侧具黄褐色长毛；腹部端缘被白或浅黄色纤毛。



图 111 肿胫条蜂 *Anthophora (P.) podagra* ♂
后足基跗节

雄体长 12mm；与雌性区别：唇基（除前幕骨陷处小黑褐色）、上唇（除基部两侧小黑褐斑及端缘黑色）、上颚基部近方形斑、额唇基横斑、眼侧三角形斑、触角柄节前表面均为乳黄色；触角第 1 鞭节长等于节 2+3；体毛均灰黄色；腹部背板绝大部分覆以黄色半直立的长毛；臀板黑色，端部钝；无胫基板；后足基跗节内侧具齿（图 111）；后腿节粗，后胫节宽；足密被细小的白毛；距黑色。

分布 新疆、甘肃；欧洲，中亚，伊朗。

黑距条蜂 *Anthophora (Paramegilla) przewalskyi* Morawitz, 1880

Anthophora przewalskyi Morawitz, 1880, *Bull. Acad. Sc. Petersb.*, 26: 348. ♀