

- 体长 9—10mm ..... 蝇条蜂 *A. (D.) muscaria*
- 2 (1) 胸部被灰黄色毛杂有黑毛; 腹部背板被黄色绒毛, 端缘具白毛带; 后足毛刷白色, 内表面金黄色, 毛嫩金黄色
- 3 (4) 唇基刻点均匀; 体长 9—11mm ..... 狐条蜂 *A. (D.) quadrimaculata*
- 4 (3) 唇基刻点稀不均匀, 中央较密, 端半部具不明显隆脊; 体长 10—11mm .....  
 ..... 瓦氏条蜂 *A. (D.) waltoni*
- 雄
- 1 (2) 触角末角膨大呈圆形, 侧扁, 触角长达中胸端部; 前足及中足腿节及胫节均粗大; 后足腿节及胫节明显粗大; 体毛灰黄色; 体长 8mm ..... 角条蜂 *A. (D.) antennalis*
- 2 (1) 触角末节正常; 足正常
- 3 (4) 颜面斑乳白色; 胸部被白毛; 腹部第 2—5 节背板具白毛带; 体长 8—9mm .....  
 ..... 白颜条蜂 *A. (D.) albifronella*
- 4 (3) 颜面斑黄色; 胸部被灰黄色毛杂有黑毛; 腹部背板被灰黄色细毛, 端缘具白毛带
- 5 (6) 唇基侧缘具小黑斑; 后足胫节正常; 体长 8—10mm ..... 狐条蜂 *A. (D.) quadrimaculata*
- 6 (5) 唇基基部及两侧具大黑斑; 后足胫节内侧弯曲, 端部呈角状; 体长 10—11mm .....  
 ..... 瓦氏条蜂 *A. (D.) waltoni*

**蝇条蜂 *Anthophora (Dasymegilla) muscaria* Fedtschenko, 1875**

*Anthophora muscaria* Fedtschenko, 1875, *Turkestan Apid.*, 1: 26.

雄体长 8—9mm; 颜面有乳白色斑, 被白毛。复眼明显宽于唇基 (侧面观); 唇基、上唇、眼侧 (触角窝以下) 光滑, 具极少而细小的刻点; 触角第 1 鞭节长等于节 2+3; 无胫基板; 第 7 背板端部具 2 齿。体黑色; 唇基 (除前幕骨陷处小黑斑)、上唇 (除基部两侧黑褐斑)、眼侧 (触角窝以下)、额唇基横纹及触角柄节前表面均乳白色; 触角黑褐色; 翅基片、翅脉均褐色; 足黑褐色; 距浅黄色; 各跗节黄褐色。体毛白色; 唇基两侧角、额、眼侧、颊、足及腹部第 1 节均被白毛; 腹部第 2—5 节背板端缘具白毛带。

雌体长 9—10mm; 与雄性区别为: 触角第 1 鞭节长等于节 2+3+4; 唇基黑色, 光滑, 具大而稀的刻点; 上唇具小皱; 颜顶及胸部被白毛杂有黑毛; 足毛白色; 后胫节及基跗节毛刷白色, 内表面黑褐色; 毛嫩褐色; 腹部第 5 节背板端缘中部被黑毛; 腹部腹面具灰白色毛。

分布 新疆; 中亚。

**狐条蜂 *Anthophora (Dasymegilla) quadrimaculata* (Panzer), 1798**

*Apis quadrimaculata* Panzer, 1798, *Faun. Insect. German.*, 5: 56. ♂

*Apis vulpina* Panzer, 1798, *Faun. Insect. German.*, 5: 56.

*Apis subglobosa* W. F. Kirby, 1802, *Monogr. apum Angl.*, 2: 295. ♀