

分布 西藏（吉隆宗戛）。




图 126 西藏条蜂 *Anthophora* (A.) *xizangensis* ♂

a. 头部; b. 第7背板; c. 第7腹板; d. 第8腹板; e. 生殖节（背面观）;
f. 生殖节（腹面观）; g. 生殖刺突（侧面观）

宽颊条蜂 *Anthophora* (*Anthomegilla*) *latigena* Morawitz, 1886

Anthophora latigena Morawitz, 1886, *Hor. Soc. Entom. Ross.*, **20**: 205.

Anthophora reinigi Hedicke, 1930, *Mitt. Zool. Mus. Berlin*, **16**(6): 856—857.

Anthophora latigena Morawitz, 1941, *Wu, Cat. Ins. Sin.*, **6**: 299.

Anthomegilla latigena (Morawitz), 1976, *Marikowskaya, Entom. Obozr.*, **55**(3): 688.

Anthophora (*Anthomegilla*) *latigena* Morawitz, 1988, *Brooks, Sci. Bull. Univ. Kans.*, **53**(9): 482.

雄体长 12mm；胸部及腹部第 1—2 节背板被黄褐色毛。颞眼距宽；上唇横宽；触角第 1 鞭节长等于节 2+3；足简单；后基跗节光滑闪光，两侧平行；第 7 背板端缘中央凹深；第 8 腹板端部针突为腹板长的 $1/7$ 。体黑色；唇基（除端缘黑色）、上唇（除两侧褐色斑）、眼侧（触角窝以下）及触角柄节前表面均为黄色；翅基片及距浅锈色；足红褐色。胸部侧面具灰色毛；胸部背板及腹部第 1—2 节背板密被黄褐色毛；第 3—7 节背板被黑毛。

分布 西藏（现为与新疆交界处的吉利亚山脉，原采集地是：Tibet: Keria Gerbirge）。