

Distant (1904) 以采自缅甸的标本建立此属, 仅包括 *L. hirsutus* Distant 1 种。后 Murraleedharan 等 (1978) 和 Péricart (1987) 分别增加该种的印度和尼泊尔的分布。Péricart (1986) 增加本属另一种, *Lippomanus carayoni* Péricart, 模式产地为尼泊尔。

世界已知 2 种, 分布于中国; 尼泊尔, 缅甸, 印度。我国已知 1 种。

毛点花蝽 *Lippomanus hirsutus* Distant, 1904

Lippomanus hirsutus Distant, 1904, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, XN (7): 221. (*origi. descrip.*;
type-locality: Burma; types deposited in Brit. Mus. Nat. Hist., London)

Distant, 1906, *Faun. Brit. India, Rhynch.*, 3: 5.

Muraleedharan et al, 1978, *Bull. zool. Surv. India*, 1 (1): 68.

Péricart, 1987, *Courier Forsch. -Inst. Senckenberg*, 93: 370.

体黄褐色, 长椭圆形, 毛被长密 (图 96)。头、前胸背板和小盾片有光泽。头长 0.37, 宽 0.35, 复眼间宽 0.18; 头中叶明显隆起, 头顶毛较多; 复眼浅黑褐, 其上有短毛; 触角第 1、2 节粗, 其上毛平伏, 长不超过该节直径, 第 3、4 节细, 其上半直立毛长超过该节直径 3 倍以上, 各节长 0.11:0.25:0.23:0.23。前胸背板长 0.30, 领宽 0.25, 后缘宽 0.74; 胫区强烈隆起, 光滑, 占据前叶 5/6, 两侧略向斜后弯伸, 胫后下陷深, 由粗糙刻点组成; 后叶刻点清楚, 中部呈横皱状; 侧缘中部略内凹, 前半呈薄边状, 胫区两侧的薄边最宽, 向前渐窄, 侧缘具一系列较长的毛, 斜后伸。小盾片中部凹陷, 两侧凹陷较深, 中后部具圆形大刻点, 刻点中央具毛。前翅内革片端部和楔片内侧大部褐色, 其上毛被半直立; 爪片具 4—5 纵列圆形大刻点, 靠近爪片缝的一列排列规则; 膜片污黄褐, 达于腹部后缘; 前翅在外革片以后略窄于腹部; 外革片长 0.64, 楔片长 0.39, 膜片长 0.80。喙伸达中胸腹板中部, 第 2 至 4 节长 0.10:0.69:0.25, 第 2 节亚基部具一褐色环。胸部腹面色略深。足上毛细密, 平伏, 长不超过该节直径。臭腺沟缘向前弯曲, 以一脊伸达后胸侧板前缘 (图 99)。腹末侧缘有少量长毛伸出。体长 2.0, 宽 0.74。

观察标本 1♀, 海南联昌, 1963. IV. 24, 周尧采。

分布 海南 (联昌); 尼泊尔, 缅甸。

沟胸花蝽族 *Dufouriellini* Van Duzee, 1916

Typegenus: *Dufouriellus* Kirkaldy, 1906

Xylocoraria Reuter (part), 1884, *Monogr. Anthocor. orbis Terres.*, p. 4.

Dufouriellinae Van Duzee (part), 1916, *List Hem. Amer. Nord.*, p. 284.

Cardiastethini Carayon, 1972, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 8 (2): 338.