

里河, 1981. Ⅷ. 14, 任树芝采; 2♀, 内蒙古阿里河齐奇岭, 1981. Ⅷ. 16, 邹环光采。

分布 黑龙江(伊春)、内蒙古(呼伦贝尔盟阿里河); 俄罗斯(西伯利亚、伊尔库茨克、外贝加尔地区、阿穆尔地区、远东地区), 蒙古, 欧洲。

双齿股花蝽 *Scoloposcelis parallelus* (Motschulsky, 1863)

Anthocoris parallelus Motschulsky, 1863, Bull. Soc. Nat. Moscow, **36** (3): 89. [origi. descrip., type-locality: Ceylon (Sri Lank); types deposited in Zool. Mus., Moscow Univ., Russia]

Reuter, 1884, Monogr. Anthocor. orbis Terres., p. 152, 153.

Sesellius parallelus (Motschulsky): Distant, 1904, Ann. Mag. Nat. Hist., **14** (7): 222.

Distant, 1906, Faun. Brit. India, Rhynch., **3**: 7.

Distant, 1910, Faun. Brit. India, Rhynch., **5**: 304.

Scoloposcelis parallelus (Motschulsky): Poppius, 1909, Act. Soc. Sci. Fenn., **37** (9): 25.

Poppius, 1910, Wien. Ent. Zeit., **29**: 140.

Poppius, 1914, Arch. Naturges., **80** (8): 9.

Esaki, 1926, Ann. Mus. Nat. Hung., **24**: 171.

Usinger, 1946, Ins. Guam, p. 2.

Gross, 1957, Rec. S. Austr. Mus., **13** (1): 140.

Hiura, 1960, Bull. Osaka Mus. Nat. Hist., **3** (12): 51.

Muraleedharan, 1977, Rec. Zool. Surv. India, **73**: 239—246.

Kerzhner & Jansson, 1985, Ann. Ent. Fenn., **51**: 38.

Zheng & Bu, 1990, Contr. Tianjin Nat. Hist. Mus., **7**: 27.

Scoloposcelis picicornis Poppius, 1909, Act. Soc. Sci. Fenn., **37** (9): 26.

体深栗褐色, 较狭长, 背腹压扁, 毛被几无(图 124)。头光泽强, 前端略浅, 长 0.36, 宽 0.38, 复眼较小, 头顶中部呈细皱刻状; 触角黄褐, 各节长 0.12:0.38:0.24:?. 第 3 节较细, 其上毛长超过该节直径。前胸背板有强光泽, 长 0.30, 领宽 0.34, 后缘宽 0.70; 领不明显, 前缘向后凹; 侧缘直, 略呈薄边状, 前角处薄边略宽, 四角各有一直立长毛; 胫区稍隆出, 中纵线处有一不明显的浅沟; 胫后缘凹陷浅; 后叶中部及亚中部宽阔地凹陷; 整个背板具横列细密刻纹, 后叶皱刻较粗糙。前翅稍污暗, 褐色; 爪片缝两侧及内革片浅褐色, 其余深褐色, 膜片灰褐色; 外革片长 0.62, 楔片长 0.46。喙浅黄褐色, 端部伸过前足基节, 第 2—4 节长 0.20:0.43:0.27。足黑褐, 胫节端部、跗节黄色; 前、后足股节膨大, 前、后足股节内侧各有两列小齿突, 前足股节的齿数少且小, 后足股节的齿数多而大, 两齿列间容纳胫节(图 133, 134); 后胫毛长超过该节直径。腹部第 7 腹节腹面中部后缘有三角形片状突起, 腹末 7—8 节侧缘各有大型刚毛状毛伸出, 长超过复眼直径两倍。体长 2.7。

观察标本: 1♀, 云南景洪, 580m; 1♂, 西藏墨脱, 1200m, 1983. IV. 10, 韩寅恒采 (IZAS)。

分布 云南 (景洪)、西藏 (墨脱)、台湾 (Poppius 1914, Hiura 1960); 印度, 斯里兰卡, 菲律宾, 印度尼西亚 (爪哇), 关岛, 巴布亚新几内亚。

丽齿股花蝽 *Scoloposcelis pulchella* (Zetterstedt, 1838)

Anthocoris pulchellus Zetterstedt, 1838, Ins. Lapp. Des. Ordo III, Hem. Col., : 265. (origi. descrip.; type-locality: Sweden; types deposited in Zool. Inst., Univ. Lund, Sweden)

Scoloposcelis pulchellus (Zetterstedt):

Péricart, 1972, Faun. Eur. Bass. Medit. Hem., 7: 280.

Elov & Kerzhner, 1977, Insects of Mongolia, 5: 218.

Kerzhner, 1988, Keys to the Insects of the Far East USSR, 2: 771.

Zheng & Bu, 1990, Contr. Tianjin Nat. Hist. Mus., 7: 27.

Zheng & Bu, 1991, Act. Zootax. Sinica, 16 (1): 126.

Xylocoris crassipes Flor, 1860, Die Rhynchoten Livlands in Systematischer Folge beschrieben, P. 670.

体细长, 背腹压扁, 几无毛被 (图 125)。头黑褐, 有强光泽, 长 0.52, 宽 0.52, 头前端粗大, 头顶宽阔, 中部无毛, 具细密刻纹; 触角深褐色, 第 3、4 节较细, 其上毛长稍超过该节直径, 各节长 0.16:0.40:0.28:0.28。前胸背板黑褐, 长 0.44, 领宽 0.44, 后缘宽 1.03; 领不明显; 侧缘直, 略成薄边状, 四角各有一直立长毛; 胝区较隆出, 中纵线处略凹陷; 胝后缘凹陷浅; 后叶中部及亚中部为浅凹陷; 整个背板具横列细密刻纹, 后叶皱刻较粗糙。小盾片基部 1/3 光滑, 端部 1/3 细密皱刻状。前翅稍污暗, 外革片基部内侧缘、爪片接合缝两侧以及楔片大部黑褐色, 内革片、爪片外侧大部以及楔片内角浅黄色, 膜片约呈灰白色, 半透明; 外革片长 1.06, 楔片长 0.58。喙第 2 节、第 3 节基半黑褐, 第 3 节端半及第 4 节黄褐 (黑龙江伊春标本) 或仅第 3 节黄褐 (西藏昌都标本); 喙略伸过前足基节, 第 2—4 节长 0.42:0.56:0.32。足黑褐, 胫节稍浅, 前、后足股节膨大; 前足股节内侧有两列小齿, 小齿由基向端部渐粗大, 两列小齿间容纳胫节 (图 137); 后足胫节毛长稍超过该节直径 (图 138)。雄虫腹部可见的第 4 腹节腹面中央有一浅色区域, 浅色区中部有一横列毛, 长约为复眼直径之半, 横列宽约为毛长者之半。雄虫阳基侧突片状, 内侧缘较直, 外侧缘端部渐尖。体长 3.5。

观察标本 1♀, 黑龙江伊春五营, 1980. VII. 20, 郑乐怡采; 1♂, 西藏昌都, 1976. V. 18, 韩寅恒采 (IZAS)。

分布 黑龙江 (伊春)、西藏 (昌都); 俄罗斯 (勒拿河地区、新西伯利亚、阿穆尔地区), 蒙古, 中亚, 欧洲。