

观察标本 1♀, 新疆绥定, 390m, 1957. Ⅷ. 31, 汪广采 (IZAS); 1♀, 同前, 1959. Ⅶ. 9, 采自米糠中。

分布 新疆 (绥定); 全北区分布。

日浦仓花蝽 *Xylocoris (Proxylocoris) hiurai* Kerzhner et Elov, 1976

Xylocoris hiurai Kerzhner et Elov, 1976, *Ent. Oboz.*, **55** (2): 366, figs. 2, 13. (origi. descrip.; type-locality: China (Fujian); types deposited in Inst. Zool. Acad. Russia, St. Petersburg, Russia)

Zheng & Bu, 1990, *Contr. Tianjin Nat. Hist. Mus.*, **7**: 26.




图 91 日浦仓花蝽 *X. hiurai* Kerzhner et Elov (体背面观)

体长椭圆形 (图 91)。头深褐色, 前端色浅, 长 0.38, 宽 0.45, 头顶较光滑, 复眼较小, 上有短毛伸出, 复眼间宽 0.30; 触角第 1、2 节黄褐, 第 2 节端部色深, 第 3、4 节黑褐, 各节长 0.12:0.32:0.30:0.30, 第 2 节毛长接近或稍超过该节直径, 第 3、4 节细, 其上毛长超过该节直径两倍以上。前胸背板和小盾片深栗褐色; 前胸背板长 0.42, 领宽 0.37, 后缘宽 0.98; 侧缘直; 前角垂缓; 领不明显; 前叶略隆起; 后叶中部及亚中部浅凹陷, 凹陷部呈横皱刻状, 两侧毛被密, 中部稀。前翅灰白色, 仅爪片缝两侧和楔片内侧缘色深, 毛被较长, 稀; 外革片长 0.96, 楔片长 0.48。喙黄色, 超过前足基节, 第 2—4 节长 0.30:0.44:0.26。足基节、股节、后足胫节黄褐色, 前、中足胫节黄色, 前、后足胫节较膨大, 胫节毛被密, 后足胫节刺长超过该节直径, 毛长接近该节直径 (图 92—94)。臭腺沟缘较宽大, 端部接近但不达于蒸发域前缘 (图 85)。腹部腹面黑褐。

翅伸过腹部末端。雄虫阳基侧突细长, 在近基部和亚端部有两处弯曲 (图 80)。雌虫腹部第 2、3 背板右侧纳精器如图 89。体长 2.2—2.7。

观察标本 1♀, 天津南开大学农场, 1963. Ⅷ. 12, 王子清采; 1♀, 天津青光农场, 1975. Ⅵ. 17, 郑乐怡采; 1♀, 北京, 1968. Ⅶ. 24, (灯诱); 4♂3♀, 河南开封, 1986. Ⅵ. 22—Ⅶ. 5; 郑州粮食学院 831、832 班采 (采自粮食仓库内); 9♂27♀, 河南郑州, 1986. Ⅵ. 22—Ⅶ. 6; 郑州粮食学院 834 班采 (采自粮食仓库内); 1♂5♀, 河南长垣韦庄, 1986. Ⅶ. 26—Ⅷ. 10, 周玉香采; 1♂, 福建龙海, 1960. Ⅴ. 7, (采自




图 92—94 日浦仓花蝽 *X. hiurai* Kerzhner et Elov
92 前足; 93 中足; 94 后足。

酒糟中); 1 ♂ 1 ♀, 广东广州, 1962. Ⅷ. 28, 郑乐怡、程汉华采; 1 ♀, 贵州罗甸, 1995. Ⅷ. 10, 卜文俊采。

分布 天津、北京、河南 (郑州、开封、长垣)、福建 (龙海)、广东 (广州); 日本 (? Kerzhner 和 Elov 1976)。

蒙古仓花蝽 *Xylocoris (Proxylocoris) mongolicus* Kerzhner et Elov, 1976

Xylocoris (Proxylocoris) mongolicus Kerzhner et Elov, 1976, *Ent. Oboz.*, **55** (2): 367, figs, 7, 11, 18. (origi. descrip.; type-locality: Mongolia (Central Amimak); types deposited in Inst. Zool., Acad. Russia, St. Petersburg, Russia)

Elov & Kerzhner, 1977, *Insects of Mongolia*, **5**: 217.

体长椭圆形。头深褐色，前端色浅，长 0.35，宽 0.44，头顶较光滑，复眼较小，上有短毛伸出，复眼间宽 0.30；触角第 1、2 节黄褐，第 2 节端部色深，第 3、4 节褐色，各节长 0.12:0.35:0.30:0.30，第 2 节毛长接近或稍超过该节直径，第 3、4 节细，其上毛长超过该节直径 3 倍以上。前胸背板和小盾片深栗褐色；前胸背板长 0.42，领宽 0.37，后缘宽 0.87；侧缘直；前角垂缓；领不明显；前叶较隆起，后叶中部及亚中部浅凹陷，凹陷部呈横皱刻状；两侧毛被密，中部稀。前翅浅黄白色，仅爪片缝两侧和楔片两侧缘色深，毛被较短、稀；外革片长 0.81，楔片长 0.46；膜片浅灰白色。喙黄色，超过前足基节，第 2—4 节长 0.23:0.37:0.26。足基节、股节、后足胫节黄褐色，前、中胫节黄色，前、后足胫节较膨大，胫节毛被密，后足胫节刺长超过该节直径，毛长接近该节直径。臭腺沟缘较细长，端部达于蒸发域前缘 (图 86)。腹部黑褐。翅伸过腹部末端。雄阳基侧突细长，较圆缓的弯曲 (图 79)。雌虫腹部第 2、3 背板右侧纳精器如图 90。体长 2.4。

本种在外观上与日浦仓花蝽 *X. hiurai* Kerzhner et Elov 和 *X. galactinus* (Fieber) 非常接近，很难区别，但本种雄虫阳基侧突呈圆缓的弯钩状，雌虫腹部第 2、3 腹板间创伤授精部位的结构不同。

观察标本 1 ♂, 江苏, 1984. Ⅶ, 赵英杰采 (采自粮食仓库)。

分布 江苏; 蒙古。

点刻花蝽族 *Almeidini* Carayon, 1972

Designated by Carayon, 1972, *Ann. soc. ent. Fr.*, **8** (2): 339.

Typegenus: *Almeida* Distant, 1910

Almeidini Carayon, 1972, *Ann. soc. ent. Fr.*, **8** (2): 339. [tribe of *Lyctocorinae* (*Anthocoridae* s. l.)]