



图 37 白斑麝凤蝶 *Byasa dasarada* 的外生殖器

A. 雄性外生殖器; B. 雌性外生殖器

腹节气门下线上有 1 个小的突起。体色黄褐色，体长约 30 mm。

寄主 木防己属 *Cocculus* spp.、细马兜铃 *Aristolochia griffithii*。

生物学 1 年发生 2 代。成虫分别于 5 月上旬至 6 月中旬和 7 月至 8 月出现，在林中飞行，好访花，没有观察到吸水现象。卵 1—3 粒产在寄主植物叶的背面。幼虫在叶背面栖息，动作迟钝，受到刺激时臭角不伸出。

分布 云南、四川、海南；锡金，不丹，尼泊尔，缅甸，越南。

中国亚种与分布

白斑麝凤蝶云南亚种 *Byasa dasarada ouvrardi* (Oberthür, 1920)

Papilio dasarada ouvrardi Oberthür, 1920, Bull. Soc. ent. Fr. 12 : 202.

分布：云南、四川。

白斑麝凤蝶海南亚种 *Byasa dasarada melanura* (Rothschild, 1905)

Papilio dasarada melanura Rothschild, 1905, Novit. zool. 12 : 78.

Byasa stenoptera Chou et Gu, 1994, In Chou, 1994: 112.

别名：玄麝凤蝶。(后翅的白斑非常退化。)

分布：海南。