

分布：西藏江孜。

✓ 蓝精灵绢蝶亚东亚种 *Parnassius acdestis macdonardi* Rothschild, 1918

*Parnassius acdestis macdonardi* Rothschild, 1918, Novit. zool., 25: 256.

分布：西藏亚东。

✓ 蓝精灵绢蝶山南亚种 *Parnassius acdestis felix* Eisner, 1929

*Parnassius acdestis felix* Eisner, 1929, Int. ent. Z. 23(4):57.

分布：西藏山南。

✓ 蓝精灵绢蝶法利亚种 *Parnassius acdestis peeblesi* (Bryk, 1932)

*Koramius acdestis peeblesi* Bryk, 1932, Parnassiana, 2: 19.

分布：西藏 Phari。

✓ 蓝精灵绢蝶拉萨亚种 *Parnassius acdestis imperatoides* Weiss et Michel, 1989

*Parnassius acdestis imperatoides* Weiss et Michel, 1989, Bull. Soc. Sci. nat., No. 61: 15.

分布：西藏拉萨。

✓ 蓝精灵绢蝶格尔木亚种 *Parnassius acdestis ohkumai* Koiwaya, 1993

*Parnassius acdestis ohkumai* Koiwaya, 1993, Studies of Chinese Butterflies, Vol. 2: 85.

(前翅亚外缘的黑带伸达  $cu_2$  室。后翅  $r_1$  室的横纹宽； $m_1$ 、 $m_2$  室的黑斑细长，等大； $m_3$  室的斑圆而几乎等大。)

分布：青海昆仑格尔木南面。

✓ 蓝精灵绢蝶纳木错亚种 *Parnassius acdestis fujitai* Koiwaya, 1993

*Parnassius acdestis fujitai* Koiwaya, 1993, Studies of Chinese Butterflies, Vol. 2: 87.

*Parnassius acdestis manco* Koiwaya; Weiss, 1992: 97.

(前翅中室内的黑斑通常退化，稀有消失的；中室端的斑则不太退化。后翅  $r_1$  室的亚缘斑较窄，故与  $r_1$  室的红斑距离较远；后翅 2 个红斑在新鲜标本中为鲜红色。)

分布：西藏纳木错。

✓ 蓝精灵绢蝶峨山亚种 *Parnassius acdestis vogti* (Bang-Haas, 1938)

*Koramius acdestis vogti* Bang-Haas, 1938, Parnassiana, 5: 58.

分布：四川峨眉山。

✓ 蓝精灵绢蝶康定亚种 *Parnassius acdestis cinerosus* Stichel, 1907

*Parnassius acdestis cinerosus* Stichel, 1907, In Seitz, I: 34.

分布：四川康定。

✓ 蓝精灵绢蝶巴塘亚种 *Parnassius acdestis irenaeaphis* (Bryk, 1943)

*Koramius acdestis irenaeaphilus* Bryk, 1943, Mitt. munchn. ent. Ges., 33: 30.

分布：四川巴塘。

✓ 翠雀绢蝶 *Parnassius delphius* (Eversmann, 1843) (图 160)

*Doritis delphius* Eversmann, 1843: 541, pl. 7, figs. 1a, b.

*Parnassius delphius* (Eversmann): Elwes, 1886: 39; Ackery, 1975: 87.

*Koramius delphius* (Eversmann): Bryk, 1935: 583.