有吸水的习性。卵单产在寄主植物嫩芽与嫩叶的背面。幼虫整个幼虫期都栖息在寄主植物的叶表面，低龄期多在阳光照射得到的部位活动。老熟幼虫在寄主植物叶的背面化蛹。

分布 新疆；中亚细亚，欧洲中部及南部，北非。

西藏旖凤蝶 *Iphiclides podalirinus*（Oberthür，1890）（图 120）

Papilio podalirinus Oberthür，1890，Etud. ent.，**13**：37.

Iphiclides podalirinus（Oberthür，1890）；Chou，1994：177.

形态 成虫：翅展 80 mm。翅淡褐色。前翅有 8 条黑色横带，其中第 1、第 2、第 5、第 7 和第 8 条到达后缘，第 3、第 4 和第 6 条只到翅的中部。后翅后缘和亚外缘各有 1 条黑带，中部有 2 条外缘黑带镶有 5 个新月斑，其中靠前缘 1 个为黄色，其余 4 个为蓝色；臀角有 1 个黑色蓝心的三角斑及赭黄色横斑。前翅反面第 4 条基半部嵌有黄色条纹，第 6 条分裂为 2 条黑色条纹；后翅反面中部黑带的中间夹有 1 条橙色细线。



图 120 西藏旖凤蝶 *Iphiclides podalirinus* 的雄性外生殖器（仿周尧，1998）

雄性外生殖器的上钩突缺；爪形突叶状，膜质；抱器瓣长三角形，末端尖；内突长角状；阳茎端基环“Y”形；阳茎长而弯曲，基部宽而呈梯形，端部细长而尖。

分布 西藏。

钩凤蝶属 *Meandrusa* Moore，1888

Meandrusa Moore，1888：284. Type-species：*Papilio evans* Doubleday.

Dubasa Moore，1888：283. Type-species：*Papilio gyas* Westwood.