

分布：云南玉龙雪山。

师古绢蝶 *Parnassius schulteri* Weiss et Michel, 1989

Parnassius schulteri Weiss et Michel, 1989, Bull. Soc. Sci. nat., No. 61: 5.

形态 翅展 40—45 mm。翅乳白色。前翅外缘弧形，前缘长度约等于内缘长度的 2 倍；中室中部与端部各有 1 个大黑斑；翅中部有“S”形灰褐色横带连接前缘斑与内缘斑；亚外缘带锯齿状，灰褐色；外缘带宽，半透明；缘毛白色。后翅前缘及中部各有 1 个黑斑；亚外缘近臀角有 2 个黑斑，近顶角的 4 个扁形黑斑连接形成横带；外缘带窄，灰褐色半透明；翅基及内缘区黑色。翅反面与正面相似。

分布 西藏拉萨。

马哈绢蝶 *Parnassius maharajus* Avinoff, 1916

Parnassius maharaja Avinoff, 1916: 353.

Parnassius cephalus maharaja Avinoff; Bryk, 1922: 50.

Parnassius acco maharaja Avinoff; Hering, 1932, Mitt. Zool. Mus. Berl. 18: 295.

形态 翅展 55—60 mm。翅乳白色。前翅外缘弧形，顶角较尖，前缘长度约等于内缘长度的 2 倍；中室中部与端部各有 1 个大黑斑；翅中部有“S”形灰褐色横带连接前缘斑与内缘斑；亚外缘由各翅室的斑列组成横带，褐色；外缘带宽，褐色；缘毛暗色。后翅前缘有 1 个镶黑边的橘黄色斑；翅中部有 1 个黑斑；亚外缘的褐色斑列雌蝶较雄蝶明显；外缘带褐色；翅基及内缘区黑色。翅反面与正面相似。

生物学 成虫在 7 月出现，多生活在海拔 5 000 m 以上的高山地带。

分布 青海、新疆、西藏（喜马拉雅山区和唐古拉山区）；克什米尔。

蜡贝绢蝶 *Parnassius labeyriei* Weiss et Michel, 1989

Parnassius labeyriei Weiss et Michel, 1989, Bull. Soc. Sci. nat., No. 61: 7.

形态 翅展 60—65 mm。翅乳白色，翅面有黄色粗鳞，呈颗粒状。前翅外缘较长，顶角较尖；中室中部与端部各有 1 个大黑斑；翅中部有“S”形灰褐色横带连接前缘斑与内缘斑；亚外缘带褐色；外缘带宽，褐色；缘毛黑白相间。后翅前缘与中部各有 1 个镶黑边的橘黄色斑；亚外缘近臀角有 2 个黑斑，近顶角的 4 个扁形黑斑连接形成横带；外缘带半透明；翅基及内缘区黑色。翅反面与正面相似。

分布 青海、新疆、西藏。