

VI.29。

分布：湖北（兴山）、海南（尖峰岭）、四川（泸定、冕宁）、云南（龙口、泸水、漕涧，丽江）、西藏（樟木）、台湾；锡金，印度，尼泊尔，缅甸，越南，泰国。

本种的抱器瓣形状个体变异很大。在我国有 2 个亚种。

(a) 鹿枝背舟蛾指名亚种 *Harpyia longipennis longipennis* (Walker, 1855)

Damata longipennis Walker, 1855, *List lepid. Insects Colln. Br. Mus.* 5: 1044.

雄性外生殖器的阳茎侧面无刺突，颚形突端部的突起较宽，抱器瓣末端有时有 1 枚刺突。

分布：云南（龙口、泸水）、西藏（樟木）；锡金，印度，尼泊尔，缅甸，越南，泰国。

(b) 鹿枝背舟蛾台湾亚种 *Harpyia longipennis formosicola* (Matsumura, 1929)

Damata longipennis formosicola Matsumura, 1929, *Ins. Matsum.* 4: 44.

Harpyia longipennis formosicola (Matsumura): Schintlmeister et Fang, 2001: 13. (list).

Harpyia longipennis yunnanensis Schintlmeister et Fang, 2001, *Neue Ent. Nachr.* 50: 54. **syn. nov.**

雄性外生殖器的阳茎侧面有 1 枚大刺突，颚形突端部的突起较窄，抱器瓣末端有时明显突出。第 8 腹板端缘骨化程度弱。

云南亚种 *Harpyia longipennis yunnanensis* Schintlmeister et Fang 与台湾亚种没有明显的区别，故作异名处理。从该种的变异情况及分布情况来看，似乎没有分亚种的必要。

分布：湖北（兴山）、海南（尖峰岭）、四川（冕宁）、云南（丽江、漕涧）、台湾。

53. 选舟蛾属 *Dicranura* Reichenbach, 1817

Dicranura Reichenbach, 1817, *Jena. Allg. Lit.-Ztg* 1 (36): 282.

Type species: *Noctua ulmi* Denis & Schiffermüller, 1775.

Exaereta Hübner, 1820, *Verz. Bekannter Schmett.* 13: 200.

Type species: *Noctua ulmi* Denis & Schiffermüller, 1775.

Uropus Rambur, 1832, *Annl. Soc. Ent. Fr.* 1 (3): 278.

Type species: *Noctua ulmi* Denis & Schiffermüller, 1775.

Dicranoura Berthold, 1827, *Nat. Familien Thierreichs*: 479.

Type species: *Noctua ulmi* Denis & Schiffermüller, 1775.

喙发达；下唇须短，向前伸不过额。额披长毛；复眼无毛；具单眼。雄蛾触角 2/3 双栉齿形，末端 1/3 和雌蛾线形。胸足腿、胫节饰浓厚长毛，后足胫节有 2 对距。前翅