

(206) 小斑枝背舟蛾 *Harpyia tokui* (Sugi, 1977) (图 219, 图版 IV: 21)*Hybocampa tokui* Sugi, 1977, *Kontyu*, Tokyo 45: 9.*Harpyia tokui* (Sugi): Schintlmeister et Fang, 2001: 54.

♂翅展 44~48 mm。下唇须灰白色，侧面混有褐色与黑色的毛。头顶灰色混有黑色与白色。胸部暗灰褐色。前翅淡铅灰色，混有赭色；前缘基部 1/3 有 1 块黑色楔形大斑，该斑围有灰色边；该斑对应的翅后缘色暗；外线浅灰色，前缘其内、外侧各有 1 块黑板；横脉纹为 1 黑点；脉端缘毛浅黄白色，其余部分暗褐色。后翅赭白色，前缘和外缘黑褐色；臀角黑色，内侧伴有 1 条短黑线；脉间缘毛赭白色，其余暗褐色。


雄性外生殖器：爪形突宽，末端中央有 1 小缺刻；颚形突基部较宽，端部指状；抱器瓣狭长，末端圆，背缘骨化，与近端部的指突并接后直伸出抱器瓣末端；阳茎细，管壁呈螺旋状骨化，末端尖。

观察标本：浙江杭州 2 ♂，1976. VI. 13。

分布：浙江（杭州）、陕西（周至）；日本。

(207) 异瓣枝背舟蛾 *Harpyia asymmetria* Schintlmeister et Fang, 2001 (图 220, 图版 IV: 28)*Harpyia asymmetria* Schintlmeister et Fang, 2001, *Neue Ent. Nachr.* 50: 54.

♂翅展 44~46 mm。翅基片灰白色。前翅铅灰色，内带黑褐色，宽而直，内外侧均衬黑色与白色线，内侧中部内凹；外线波状；横脉纹为 1 黑点；外线以外的端部颜色

图 220 异瓣枝背舟蛾 *Harpyia asymmetria* Schintlmeister et Fang

A. 第 8 腹板；B. 雄性外生殖器；C. 阳茎