

雄性外生殖器的爪形突细长；颞形突缺；抱器瓣分支；阳茎长，内有角状器。  
本属已知 4 种，分布在东洋区。我国只记载了 1 种。

**(165) 东润舟蛾 *Liparopsis formosana* Wileman, 1914** (图 177, 图版 III: 29)

*Liparopsis formosana* Wileman, 1914, *Entomologist* 47: 323; Schintlmeister, 1992: 83.

*Liparopsis postalbida formosana* Wileman: Kiriakoff, 1968: 111.

翅展 ♂ 32~36 mm, ♀ 42~44 mm。头部与颈板灰白色。胸部背面赭褐色，被灰白色毛。腹部背面灰白色与褐色混杂。前翅灰白色，散布褐色鳞片，从前缘 1/4 到后缘中央的整个基部形成 1 块三角形大暗斑，外缘区也常形成松散的暗斑；内线和外线比较模糊，由 1 列小点组成，通常只有近前缘的点明显可见。后翅白色，前缘和外缘有褐色鳞片。

**雄性外生殖器：**第 8 背板基部两侧呈指状突出，腹板基部有 1 块半圆形的片状突起；爪形突细长，末端尖；抱器瓣背半部膜质，其近基部有膜质突起；抱器瓣腹半部骨化，基部有 1 盆状的长分支；阳茎端基环宽大；阳茎很长，端部有多列小齿突；囊形突短，末端尖。

**雌性外生殖器：**产卵瓣大；第 8 腹板很短；交配孔处有 2 个马蹄形骨片；囊导管基部宽而有些骨化，端部变窄；囊体相对较小，无囊突。

**观察标本：**浙江天目山，1 ♂，1981.VIII.5；湖北兴山龙门河 1350 m，1 ♀，1993.VII.16；湖南慈利，1 ♀，1988.X.17；江西大余，2 ♂，1977.VI.23；福建三港，2 ♀，1979.VIII.13，1 ♂，1980.X.23，武夷山，1 ♀，1983.VI.1，将乐 800 m，2 ♀，1990.IX.9，挂墩，1 ♀，1979.VII.12；海南尖峰岭，1 ♀ 2 ♂，1978.IV.15；广西金秀圣堂山 900 m，2 ♂，1999.V.18，防城八板乡 550 m，1 ♂，2000.VI.4；云南永营林场 2190 m，1 ♂，1979.V.6。

**分布：**浙江（天目山）、福建（武夷山、将乐、挂墩）、江西（大余）、湖北（兴山）、湖南（慈利）、广东（连平）、广西（金秀、防城）、海南（尖峰岭）、云南（永营林场）。

## 42. 对纷舟蛾属 *Hemifentonia* Kiriakoff, 1967

*Hemifentonia* Kiriakoff, 1967: 152

Type species: *Parafentonia inconspicua* Kiriakoff, 1963

*Parafentonia* Kiriakoff, 1963, *Bonn. Zool. Beitr.* 14: 277. nec Roepke 1944.

喙发达；下唇须短，向前伸刚过额。雄蛾触角 2/3 短单栉齿形具毛簇，末端线形。后足胫节有 2 对距。前翅长，近三角形，前缘外半部略拱；M<sub>2</sub> 脉从横脉中央稍上方伸