

雄性外生殖器的爪形突宽，末端分岔；颚形突 1 对，粗棒状；背兜短宽；抱器瓣弯；阳茎细长，有角状器。

本属已知 2 种，分布在古北区和东洋区东部，我国均有分布。

分种检索表

- 1. 前翅臀角处有 1 枚暗斑，雄触角分支短；雄性外生殖器的抱器背端缘有 1 个突起 游雾舟蛾 *N. dubiosa*
前翅臀角处很少有 1 枚暗斑，雄触角分支长；雄性外生殖器的抱器背端缘无突起 灰雾舟蛾 *N. tsushimensis*

(244) 游雾舟蛾 *Nephodonta dubiosa* (Kiriakoff, 1963) (图 257)

Norracoides dubiosa Kiriakoff, 1963, *Bonn. Zool. Beitr.* 14 : 279.

Nephodonta dubiosa (Kiriakoff); Schintlmeister, 1992: 50.

♂翅展 44 mm。下唇须暗褐色，缘毛颜色较浅。头部褐色。胸部背面灰褐色，侧面苍白色。前翅灰白色，散生棕色鳞片；内线和外线外衬淡白色；亚端线红褐色；臀角处有 1 枚暗色斑。后翅灰白色。

雄性外生殖器：第 8 腹板端缘的凹陷窄而深，两侧圆；爪形突末端分岔尖；颚形突短，末端尖；抱器瓣末端宽圆，背缘有 1 枚瘤状突起；阳茎细长，亚端侧面和末端各有 1 刺状突起。




图 257 游雾舟蛾 *Nephodonta dubiosa* (Kiriakoff) 的雄性外生殖器 (仿 Kiriakoff, 1963)

观察标本：本种的正模和副模标本 1938 年 4 月采自我国福建挂墩，存德国波恩。
分布：福建（挂墩）；越南。