图 265 灰色舟蛾 *Notodonta griseotincta* Wileman

A. 雄性外生殖器；B. 阳茎；C. 第 8 腹板

亚端有 1 垫状突起；阳茎粗长，约比抱器背长 2/3，端部稍膨大，内有许多小刺突。

观察标本：福建武夷山，1 ♂，1983.V.16。

分布：福建（武夷山）、台湾。

(253) 黑色舟蛾 *Notodonta nigra* Wu et Fang, 2003 (图版 V: 3)

Notodonta nigra Wu et Fang, 2003, *Acta Zootaxonomica Sinica* 28 (1): 146.

翅展 ♂ 52 mm, ♀ 56~62 mm。头和胸部背面灰褐色，翅基片边缘黑色。腹部背面灰褐色。前翅暗灰褐色，所有斑纹暗褐色：内、外线不清晰，内线在中室下呈齿形曲，随后略向内弯伸达后缘的齿形毛簇处，内衬灰白边；横脉纹模糊，衬灰白色边；外线锯齿形，在 M_1 脉上呈钝角形曲， Cu_2 脉以后垂直于后缘，外衬灰白边；亚端线模糊，较粗；端线细；脉端缘毛较暗。后翅浅灰褐色，臀角和横脉纹较暗；外线模糊，灰白色。前、后翅反面褐灰色，均具灰褐色外线，前后彼此衔接，外衬灰白边；后翅横脉纹暗灰褐色，与外线不连接。

雄性外生殖器：第 8 腹板端缘弧形凹入；爪形突向腹面弯曲；颚形突椭圆形；抱器瓣长椭圆形，端部有 1 枚大叶尖突起；背缘基部很宽；阳茎细而直，比抱器瓣略长，端部一侧呈尖刺突，另一侧有 1 块生齿的骨片。

雌性外生殖器：后表皮突长，前表皮突粗短；导管端片长筒状；囊导管较短，内有1块弱骨片，囊颈处也有1块弱骨片；囊体大，囊突片状，上有许多小齿突。




图 266 黑色舟蛾 *Notodonta nigra* Wu et Fang

A. 雌性外生殖器；B. 雄性外生殖器；C. 阳茎；D. 第8腹板

观察标本：陕西太白黄柏塬 1350 m, 1 ♂ 3 ♀, 1980. VII. 11~17, 宁陕火地塘 1 ♀, 1979. VII. 23 (正模和副模)。

分布：陕西 (太白、宁陕)。

本种外形与烟灰舟蛾 *N. torva* (Hübner) 十分相似，惟前翅横脉纹不清晰可与后者相区别。外生殖器也与后者较相似，但本种雄性外生殖器的抱器瓣背缘基部宽而不形成明显的垫状突起，端部的突起宽叶状而不是指状；本种雌性外生殖器的囊颈处多1块骨片。

(254) 黄白舟蛾 *Notodonta ziczac* (Linnaeus, 1758) (图 267, 图版 V: 10)

Bombyx ziczac Linnaeus, 1758, Syst. Nat. ed. 10 : 504.