

图 269 赭小内斑舟蛾 *Peridea graeseri* (Staudinger)

A. 雄性外生殖器; B. 阳茎; C. 第 8 腹板

1 ♂, 1998. VII. 18; 甘肃文县邱家坝 2350 m, 1 ♂, 1999. VII. 22, 文县铁楼 1450 m, 1 ♂, 1999. VII. 24。

分布: 北京 (百花山、三堡)、山西 (绵山)、黑龙江 (伊春岱岭)、吉林 (长白山)、湖北 (兴山)、陕西 (留坝、周至)、甘肃 (文县)、台湾; 日本, 朝鲜, 俄罗斯。

本种在我国有 2 个亚种。

(a) 赭小内斑舟蛾指名亚种 *Peridea graeseri graeseri* (Staudinger, 1892)

*Notodonta graeseri* Staudinger, 1892, *Mem. Lepid.* 6: 351.

体型较小, 底色较暗。

分布: 中国大陆的上述地区; 日本, 朝鲜, 俄罗斯。

(b) 赭小内斑舟蛾台湾亚种 *Peridea graeseri tayal* Kishida, 1987

*Peridea graeseri tayal* Kishida, 1987, *J. Japan Heterocerist's Soc.* 142: 261.

比指名亚种体型更大, 底色更浅。

分布: 台湾。