



图 448 幽蚕舟蛾 *Phalerodonta inclusa* (Hampson)

A. 雄性外生殖器; B. 阴茎; C. 第 8 腹板

锡金, 尼泊尔, 越南。

本种包括 3 个亚种, 我国有 2 个亚种。

(a) 幽蚕舟蛾指名亚种 *Phalerodonta inclusa inclusa* (Hampson, 1910)

*Stauropus inclusa* Hampson, 1910, *J. Bombay nat. Hist. Soc.* 20: 91.

*Phalerodonta inclusa inclusa* (Hampson): Schintlmeister et Fang, 2001: 93.

前翅的亚端线不发达。

分布: 湖北 (武昌)、陕西 (周至); 印度北部, 锡金, 尼泊尔, 越南。

(b) 幽蚕舟蛾台湾亚种 *Phalerodonta inclusa formosana* (Okano, 1970)

*Phalerodonta manleyi formosana* Okano, 1970, *Tohoku Konchu Kenkyu* 4 (3~4): 53~54.

*Phalerodonta inclusa formosana* (Okano): Schintlmeister et Fang, 2001: 93.

前翅更窄, 外缘更斜, 亚端线较发达。雄性外生殖器的抱器瓣端部突起更宽大。

分布: 台湾。

(434) 基氏蚕舟蛾 *Phalerodonta kiriakoffi* Schintlmeister, 1985 (图 449)

*Phalerodonta kiriakoffi* Schintlmeister, 1985, *Bonn. Zool. Beitr.* 36: 221.

翅展♂44 mm。下唇须和额暗褐色。头和胸部苍灰褐色, 颈板后缘暗褐色; 胸足跗节具白环。腹部背面灰黄褐色。前翅淡黄褐色, 有丝质光泽, 基部和端部散布雾状暗褐色点, 基部的暗色鳞片在下半部密集呈 1 纵带; 3 条横线暗褐色: 基线深锯齿形; 内线