



图 308 银拟纷舟蛾 *Pseudofentonia* (*P.*) *argentifera* (Moore)

A. 阳茎; B. 雄性外生殖器; C. 第 8 腹板

度北部, 尼泊尔, 锡金, 缅甸, 越南, 印度尼西亚。

本种有 2 个亚种, 在我国均有分布。

(a) 银拟纷舟蛾指名亚种 *Pseudofentonia* (*P.*) *argentifera argentifera* (Moore, 1866)

*Heterocampa argentifera* Moore, 1866, *Proc. Zool. Soc. London*: 813.

前翅黑色斑纹发达; 后翅褐色, 内缘橘黄色。

分布: 台湾; 印度北部, 尼泊尔, 锡金, 缅甸, 印度尼西亚。

(b) 银拟纷舟蛾西南亚种 *Pseudofentonia* (*P.*) *argentifera anti flavus* Schintlmeister, 1997

*Pseudofentonia* (*Pseudofentonia*) *argentifera anti flavus* Schintlmeister, 1997, *Entomofauna Suppl.* 9: 111.

前翅黑色斑纹没有指名亚种发达; 后翅淡褐色, 内缘的黄色区仅在基部。

分布: 湖南 (桑植天平山)、四川 (冕宁)、云南 (镇雄、漕涧、普洱); 越南。