

近中部有 1 枚指突，端部呈球拍状扩大；阳茎较粗直，约与抱器瓣等长，端部侧面有 1 枚粗刺突。

雌性外生殖器：后表皮突细长，前表皮突几乎与后表皮突等长；导管端片漏斗形；囊导管细长；囊体略呈圆形；囊突小而骨化程度弱，上有一些小刻点。

观察标本：云南安宁温泉 1890 m, 2 ♂, 1980.VIII.4, 安宁 1 ♂, 1980.VI.16, 宜良 1900 m, 1 ♂, 1979.VI.15, 腾冲 1760 m, 1 ♀, 1977.VII.16, 漾濞 1800 m, 1 ♂, 1980.VIII.12, 西双版纳 700 m, 1 ♂ 2 ♀, 1993.IX.14.

分布：云南（安宁、宜良、大理、漾濞、腾冲、弥渡、普洱、西双版纳）、四川（渡口）、台湾；越南，泰国，印度尼西亚。

本种有 2 个亚种，我国西南分布的为云雾亚种，台湾种群的亚种地位待定。

(a) 仿夜舟蛾云雾亚种 *Pseudosomera noctuiformis yunwu* Schintlmeister et Fang, 2001

Pseudosomera noctuiformis yunwu Schintlmeister et Fang, 2001, *Neue Ent. Nachr.* 50 : 81.

体型较指名亚种稍大，前翅混有黄绿色的鳞片（指名亚种无黄绿色鳞片）。雄性外生殖器的爪形突呈直角状弯曲。

分布：云南（安宁、宜良、大理、漾濞、腾冲、弥渡、普洱、西双版纳）、四川（渡口）；泰国。

97. 霭舟蛾属 *Hupodonta* Butler, 1877

Hupodonta Butler, 1877, *Ann. Mag. Nat. Hist* (4) 20 : 475.

Type species: *Hupodonta corticalis* Butler, 1877.

下唇须粗，上举达头顶。雄触角双栉齿形分支到末端，雌触角线形。后足胫节有 2 对距。前翅狭长，前缘在顶角前稍拱，顶角较尖；外缘斜，弧形拱；臀角钝圆；内缘直，无齿形突；M₂ 脉出自横脉中央，M₁ 脉与 R₅ 脉共柄；后翅 M₂ 脉同前翅，M₁ 与 R_s 脉共柄较长，达脉长的 1/4。

雄性外生殖器的爪形突狭长；颚形突 1 对；抱器瓣长卵形；阳茎细，明显比抱器瓣短。

本属世界已记载 3 种，分布在古北区和东洋区，我国均有记录。

分种检索表

据外形

1. 前翅亚端线锯齿形，中部有黑褐色的纵条纹 木霭舟蛾 *H. lignea*
前翅亚端线微波状，中部无黑褐色的纵条纹 2