


(48) 不丹枝舟蛾 *Ramesa bhutanica* (Bänziger, 1988) (图 62, 图版 I : 16)*Poncetia bhutanica* Bänziger, 1988, *Nat. Hist. Bull. Siam Soc.* **33** : 32.*Ramesa bhutanica* (Bänziger): Schintlmeister *et* Fang, 2001: 34.图 62 不丹枝舟蛾 *Ramesa bhutanica* (Bänziger) 的雄性外生殖器

体长 19~24 mm, 翅展 38~46 mm。头褐色, 胸部背面灰褐色, 颈板后缘、冠形毛簇末端和后胸背面暗褐色。腹部背面暗褐色, 末端 2 节中央和臀毛簇灰褐色。前翅灰褐色, 翅基部中室以上的区域暗褐色, 翅顶和后缘较明亮; M_2 与 M_3 脉间暗褐色, 其中在亚端线和外线间有 1 条银纹, 基部有 3 个小黑点; 内线黑色锯齿形, 在脉上的点较清晰, 有 1 条暗褐色影状肘形带几乎与内线重叠; 横脉纹由横脉内侧 1 大黑色方点和外侧 2 个较小的黑色点组成; 外线双道平行, 内面 1 条影状暗褐色带, 外面 1 条黑色锯齿形, 其中每一内、外锯齿尖上的点较清晰似呈两列黑点; 翅顶到后缘的外线外侧有 2 条暗褐色影状斜带, 亚端线由 1 列脉间小黑点组成, 每点内侧衬银白边, 端线细黑色, 由 1 列脉间月牙形线组成。后翅暗到暗褐色, 脉端缘毛赭色。

雄性外生殖器: 爪形突较宽大, 倒梯形, 末端中央有凹刻; 颚形突长, 粗壮, 几乎直, 末端圆, 中部有 1 枚叶状突起; 抱器瓣大, 近四方形, 抱器腹基部有一块长方形突起; 阳茎明显长于抱器背, 中等粗, 基部漏斗形, 中央微曲, 阳茎端膜端部外侧有 2 枚大齿突, 中部有许多小刺突; 阳端基环长; 囊形突很短, 圆形; 第 8 腹片近三角形, 基缘有两个短宽而尖的突起。

观察标本：广西金秀罗香 450m, 27 ♂♂, 2000. VI. 30 ~ VII. 1, 金秀圣堂山 900 ~ 1900m, 3 ♂♂, 2000. VI. 28, 那坡德孚 1350m, 1 ♂, 2000. VI. 19, 龙州三联 350m, 1 ♂, 2000. VI. 13。

分布：广西（金秀、那坡、龙州）、云南（沧源、福贡）；不丹，尼泊尔，印度，缅甸。

本种与豹枝舟蛾同时、同地发生，只是个体数量的比例在各地不同。

(49) 贝枝舟蛾 *Ramesa baenzigeri* Schintlmeister et Fang, 2001 (图 63, 图版 I : 17)

Ramesa baenzigeri Schintlmeister et Fang, 2001, *Neue Ent. Nachr.* 50 : 34.

体长 18 ~ 22 mm, 翅展 40 ~ 44 mm。头褐色，胸部背面灰褐色，颈板后缘、冠形毛簇末端和后胸背面暗红褐色。腹部背面暗红褐色，末端 2 节中央和臀毛簇灰褐色。前翅灰褐带紫色，翅顶和后缘较明亮； M_2 与 M_3 脉亚端线和外线间有 1 条不太明显的银纹；基部有 3 个小黑点；内线黑色锯齿形，在脉上的点较清晰，有 1 条暗褐色影状肘形带几乎与内线重叠；横脉纹由横脉内侧 1 大黑色圆点和外侧 2 个较小的黑色点组成；外线双道平行，内面 1 条影状暗褐色带，外面 1 条黑色锯齿形，其中每一内、外锯齿尖上的点较清晰似呈两列黑点；翅顶到后缘的外线外侧有 2 条暗褐色影状斜带，亚端线由 1 列脉间小黑点组成，每点内侧衬银白边，端线细黑色，由 1 列脉间月牙形线组成。后翅暗红褐色，脉端缘毛赭色。




图 63 贝枝舟蛾 *Ramesa baenzigeri* Schintlmeister et Fang 的雄性外生殖器