

伸出；具狭长副室； R_5 脉、 $R_4 + R_3$ 脉和 R_2 脉同出于副室顶角。后翅 M_2 脉从横脉中央稍上方伸出； $M_1 + R_s$ 脉共柄短，约为 M_1 脉长的 $1/5$ 。

雄性外生殖器的爪形突通常宽大，末端多少有点分岔；颚形突 1 对；抱器瓣短，基部有宽大的板状突起；阳茎细长。第 8 腹板端半部中央有 1 对棒状骨化区。

本属世界已记载 7 种，分布在东洋区和古北区。我国已知 6 种。

分种检索表

据 雄 蛾

1. 前翅外缘 $M_{1,2}$ 脉间有 1 浅色楔状纹 2
前翅外缘 $M_{1,2}$ 脉间无楔状纹 3
2. 前翅锈红褐色， Cu_2 脉基部有 1 枚银白色的三角形小斑..... 锈玫舟蛾 *R. ornata*
前翅灰褐色，中室下缘外半部和 Cu 脉基部各有 1 条狭长的金斑 金纹玫舟蛾 *R. auritracta*
3. 前翅三角形银斑两侧伴有三角形银点 4
前翅三角形银斑两侧无三角形银点 肉桂玫舟蛾 *R. cinnamomea*
4. 阳茎端基环侧面无齿突，颚形突端部密布齿突..... 黑纹玫舟蛾 *R. x-magnum*
阳茎端基环侧面密布齿突，颚形突端部仅边缘有齿突 5
5. 颚形突端部方形，抱器基突外缘凹 暗玫舟蛾 *R. plusioides*
颚形突端部卵形，抱器基突外缘直 胞银玫舟蛾 *R. sororella*

(478) 暗玫舟蛾 *Rosama plusioides* Moore, 1879 (图 494, 图版 VII: 23)

Rosama plusioides Moore, 1879, *Descr. New Indian lep. Ins. Colln. Late Mr. Atkinson* (1): 62.

Rosama fusca Cai, 1979, *Acta Ent. Sinica* 22: 464.

♂ 体长 14 mm，翅展 32 mm 左右。头和胸部背面暗红褐色，后胸带浅黄色。腹部背面暗褐色，末端两节浅黄色；腹面色较淡，臀毛簇黑色。前翅暗红褐色，中室以上的前缘和外缘暗褐色到紫褐色；中室以下的后缘、外缘中央和前缘外半部中央带淡黄色；中室下缘端部有 1 个三角形银斑，两侧各具小银点，外面的稍大，由 4 个小三角形点排成平行 2 行，内面的不清晰，略呈三角形；中央银斑下有 1 灰红褐色菱形斑；内线不清晰，中室下银斑以内的基部有 3~4 条暗红褐色波浪形横线；亚端线黑色，波浪形，内衬灰白边；端线黑色，每一脉端上有 1 银灰色点；缘毛赭黄色。后翅灰褐色，端线细，暗褐色；脉端缘毛暗褐色；其余淡灰黄色。

雄性外生殖器：爪形突中等宽，基部几乎不收缩，端部长圆，末端中央深缺刻，两侧呈钝齿形分岔；颚形突短，端部增大呈方片形，端部上缘和外缘具小齿；抱器瓣短，端部窄，抱器基突大，板形，腹缘内凹而具小齿；阳茎稍长于抱器瓣，中等粗，端部渐窄，略拱；阳端基环两侧发达，呈 2 锤形突起，其上布满小齿。

幼虫：头部具细麻点，浅黄绿色，两侧各有 3 条灰黑色纹，前 2 条分别从上颚和单

眼向后伸，另1条位于腹侧面。身体背面绿色，胸部中央红色，气门上方有1条红线伸至下面斜向腹中央的暗线上；气门白色具暗边。胸、腹足淡红色。

寄主植物：山蚂蝗属 *Desmodium* (蝶形花科)。

观察标本：四川西昌泸山，1♂，1974.VIII.2，韩寅恒采 (*R. fusca* 的正模)；云南宾川鸡足山 1900~2400 m，3♂♂，1980.V.21，1982.VI.21，漾濞上街林场 1650 m，1♂，1980.VIII.28，洱源赶羊涧林场 2100 m，1♂，1980.VI.1。

分布：广东 (连平)、四川 (西昌)、云南 (宾川、漾濞、洱源)；印度北部，尼泊尔，越南，印度尼西亚。




图 494 暗玫舟蛾 *Rosama plusioides* Moore 的雄性外生殖器

本种与胞银玫舟蛾 *R. sororella* Bryk 很相似，但全体底色很暗，腹部背面近黑褐色，末端两节浅黄色；雄性外生殖器的爪形突基部不特别收缩，整个不呈倒卵形；颚形突端部较扁宽的长方形，边缘锯齿形；抱器基突端部较尖，腹缘中央内切，而胞银玫舟

蛾则呈正长方形。

(479) 胞银玫舟蛾 *Rosama sororella* Bryk, 1949 (图 495)

Rosama sororella Bryk, 1949, *Ark. Zool.* 42A (19): 38; Cai, 1979: 137.

♂体长 12~13 mm, 翅展 30 mm。头和胸部背面暗红褐色, 后胸带浅黄色。腹部背面灰褐色, 腹面色较淡, 臀毛簇黑色。前翅暗红褐色, 中室以上的前缘和外缘较暗; 中室以下的后缘、外缘中央和前缘外半部中央带淡黄色; 中室下缘端部有 1 个三角形银斑, 两侧各具小银点, 外面的稍大, 由 4 个小三角形点排成平行 2 行, 内面的不清晰, 略呈三角形; 中央银斑下有 1 灰红褐色菱形斑; 内线不清晰, 中室下银斑以内的基部有 3~4 条暗红褐色波浪形横线; 亚端线黑色, 波浪形, 内衬灰白边; 端线黑色, 每一脉端上有 1 银灰色点; 缘毛赭黄色。后翅灰褐色, 端线细, 暗褐色; 脉端缘毛暗褐色; 其余淡灰黄色。




图 495 胞银玫舟蛾 *Rosama sororella* Bryk 的雄性外生殖器