



图 216 棕斑索舟蛾 *Somera viridifusca* Walker 的雄性外生殖器

缘棕色。后翅浅棕色。

雄性外生殖器：爪形突细长，背兜侧突很长；抱器瓣狭长，由基部向端部逐渐变窄，末端尖；抱器背基突比背兜侧突短约 1/5；阳茎比抱器瓣长，端部细，基部有小齿突。

观察标本：广西那坡德孚 1350 m, 1 ♂, 2000. VI. 19; 云南龙口 1200 m, 1 ♂, 1979. VI. 13。

分布：广西（那坡）、海南（黎母山）、云南（龙口）、台湾；印度北部，尼泊尔，泰国，越南，印度尼西亚，马来西亚，菲律宾。

(204) 绿索舟蛾 *Somera virens watsoni* Schintlmeister, 1997 (图 217, 图版IV: 12)

Somera virens watsoni Schintlmeister, 1997, Entomofauna Suppl. 9 : 99.

♂ 翅展约 45 mm。下唇须赭黄白色，背缘暗棕色。触角干赭白色，分支褐色。头部灰绿色。胸部背面灰绿色与褐色混杂，后缘绿色。腹部基缘黑褐色，其余部分浅棕色有暗棕色横带，末节绿色。前翅绿色，中室和臀区各有 1 条浅棕色纵纹，横线黑褐色；基线双股，中部断裂；内线双股，直；中线双股，仅在前缘和内缘明显；外线较宽，上半部双股；端线细而明显；脉端缘毛色浅。后翅棕色。



图 217 绿索舟蛾 *Somera virens watsoni* Schintlmeister 的雄性外生殖器

雄性外生殖器：爪形突细长，背兜侧突长；抱器瓣较宽，端部稍窄，末端圆；抱器背基突只比背兜侧突略短；阳茎比抱器瓣长，端部细，基部有小齿突。

观察标本：海南尖峰岭 1♀, 1983.IV.14; 云南云县 1200 m, 1♂, 2000.IV.10。

分布：海南（尖峰岭）、云南（云县）；越南，印度尼西亚（指名亚种）。

52. 枝背舟蛾属 *Harpyia* Ochsenheimer, 1810

Harpyia Ochsenheimer, 1810, Schmett. Eur. 2 : 19.