



图 199 胜胯舟蛾 *Syntypistis victor* Schintlmeister et Fang  
A. 雄性外生殖器; B. 第 8 腹板; C. 阴茎; D. 雌性外生殖器

(188) 斯胯舟蛾 *Syntypistis spitzeri* (Schintlmeister, 1987) (图 200, 图版Ⅳ: 23)

*Quadricalcarifera spitzeri* Schintlmeister, 1987, *Entomofauna* 8 : 56.  
*Syntypistis spitzeri* (Schintlmeister): Schintlmeister et Fang, 2001, *Neue Ent. Nachr.* 50 : 51.

翅展♂ 36~42 mm。头部和胸部背面褐色与灰白色混杂。腹部棕褐色。前翅暗褐色，基部和端部有浓密的绿色细鳞片；斑纹棕褐色；内线稍呈波状，明显将绿色的基部与褐色的中部分开；外线较粗，几乎直；亚端线细，波状。后翅浅棕色，前缘颜色更暗。

**雄性外生殖器：**第8背板端缘中部“U”形凹入（凹刻窄），基缘两侧呈指状突出；第8腹板端缘整个呈弧形浅凹（两侧圆），并沿凹入边缘呈月牙状增厚，基缘中部呈指状突出；背兜窄；爪形突相对短粗，末端较尖；颚形突窄，宽度与爪形突相当，末端圆而有细齿；抱器瓣狭长，中部有1枚瘤状突起，末端只有1枚大刺突；阳茎端基环短宽，端缘两侧稍突出；阳茎短粗，由基部向端部逐渐变细到2/3处，端部1/3又膨大，并有1列小齿突；囊形突中等长。




图 200 斯胯舟蛾 *Syntypistis spitzeri* (Schintlmeister)

A. 雄性外生殖器；B. 阳茎；C. 第8腹板

**观察标本：**江西九连山，1 ♂，1977. V. 20；云南屏边大围山 1500 m，1 ♂，1956. VI. 19；广西苗儿山九牛场 1100 m，1 ♂，1985. VII. 13，金秀林海山庄 1100 m，1 ♂，2000. VII. 2。

**分布：**江西（九连山）、广西（苗儿山、金秀）、云南（屏边）；越南。

**(189) 主胯舟蛾 *Syntypistis jupiter* (Schintlmeister, 1997) (图 201)**

*Quadricalcarifera jupiter* Schintlmeister, 1997, *Entomofauna Suppl.* 9: 93.

*Syntypistis jupiteri* (Schintlmeister): Schintlmeister et Fang, 2001, *Neue Ent. Nachr.* 50: 51.

翅展 ♂ 48~52 mm，♀ 58~61 mm。头部与胸部有灰色毛，胸部中央有 1 条浅色